



De slaapplaats werd ook door Bruine Kiekendieven gebruikt. Dit betrof vrijwel uitsluitend juvenielen. Een enkel adult ♂ viel in op 29 augustus. Voor het overige werden ♂♂ alleen op doortrek naar Ruigoord gezien. De Bruine Kieken werden door de ringtails praktisch genegeerd, maar de Blauwe ♂ kreeg het op 31 augustus zwaar te verduren. Om 20.10 uur werd hij door een Bruine Kiek te kj vanaf de slaapplaats tot aan het Westhofbos achtervolgd, een afstand van circa 3 kilometer hemelsbreed. Pas toen het geheel donker was keerde de Blauwe Kiekendief schielijk terug.

Van 23 augustus tot 19 september bezocht ik de slaapplaats elf maal. Ik zag er meestal drie exemplaren invallen, soms twee. Eénmaal waren er vier ter plaatse. Gemiddeld was de bezetting 2,8 exemplaren.

In totaal waren er zeker vijf individuen in de onderhavige periode op de slaapplaats: 2 ♀♀, op 15 september zag ik ze bij elkaar op het dijkje bij de Ringweg. Mogelijk was één van beide het merkwaardig getekende ♂ dat ik op 2 oktober in de Houtrakpolder zag. De staartpennen vertoonden fijne zwarte dwarsstreepjes die in het geheel niet op de forse dwarsbanden van een ringtail leken. Op 15 september was daarvan echter niets te zien. Eén van de ♀♀ miste aan beide handen enige pennen. Twee donkere ringtails waren ter plaatse op 19 september. Verder zag ik regelmatig een lichte ringtail.

Over de oorzaak van de onverwachte belangstelling voor onze regio bij Blauwe Kiekendieven in de nazomer kan ik alleen de volgende elementen noemen:

- 1) geschikt terrein om een slaapplaats in te vestigen, namelijk tarwevelden
- 2) geschikt jachtterrein, namelijk een lage begroeiing
- 3) grote aantallen veldmuizen. (In de Haarlemmermeer werd dat jaar van een plaag gesproken. De Ransuil die ik op 10 oktober '88 in de Houtrakkerhoek zag jagen, ving er bij klaarlichte dag vier. Aangenomen dat het inderdaad allemaal veldmuizen waren).

Over de herkomst van de Blauwe Kiekendieven tast ik in het duister. Het is echter niet de eerste keer geweest dat ik in de zomer Blauwe Kiekedieven zag. In 1987 zag ik een adult ♂ op 21 augustus en op 19 september. De eerste in de Houtrakkerhoek en de tweede in de omgeving van de Molenwetering. Ik heb toen echter geen slaapplaats vastgesteld.

#### Overzicht

datum	aantal	♂	ringtail	perceel	wind	zicht	
23-8	2	1	1	IV	W3B	<5	
25-8	3	1	2	IV	ZW5B	>5	
27-8	3	1	2	IV	ZW4B	>5	
29-8	2	1	1	V, VI	0-1 B	>5	
31-8	2	1	1	V, VI	Z4B	>5	
5-9	3	1	2	V, VI	ZW3B	>5	
8-9	3	1	2	V, VI	ZO3B	>5	1
9-9	3	1	2	V, VI	0 B	<5	
15-9	4	2	2	V, VI	NO4B	<5	2
17-9	3	1	2	V, VI	NW4B	>5	
19-9	3	1	2	V, VI	W3B	>5	
22-9	geen slaapplaats meer in de akkers: alles gemaaid						

1) perceel III, IV gemaaid

2) regen