

## INVENTARISATIE OEVERLANDEN AMSTELVEENSE EN KLEINE POEL 1996

Mark Kuiper

Ook in 1996 inventariseerde een groepje Amstelveense vogelaars in het kader van het SOVON-Broedvogel Monitoring Project de territoria in de westelijke oeverlanden van de Amstelveense Poel. In dit moerassige, deels met berken- en elzenbos begroeide laagveen in het zuiden van het Amsterdamse Bos werden 32 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 140 territoria (zie tabel 1). Een vergelijking met vorig jaar (*De Gierzwaluw* 34, nr. 2) doet vermoeden dat het Waterhoen te lijden heeft gehad van de relatief strenge winter: de soort zakte van 9 naar 5 territoria. Ook het aantal Kuifeenden halveerde tot 2.

Opvallend is dat andere 'koudegevoelige' soorten minder werden getroffen: zowel Meerkoet als Winterkoning zakten licht van 13 naar 11. Mogelijk weten deze soorten beter te profiteren van de nijver vogelvoerende bevolking in Bovenkerk en Amstelveen.

Als nieuwkomers konden Nijlgans, Staartmees en Holenduif worden begroet. Aardig is dat de Matkop ieder jaar een extra territorium vestigt en nu op 3 uitkomt. De Tuinfluiter zit duidelijk in de lift met een stijging van 6 naar 10. De Zwartkop was minder fortuinlijk: een daling van 3 naar 1.

Tabel 1 Broedvogelinventarisatie westelijke oeverlanden Amstelveense Poel 1996

Fuut	3	Holenduif	1	Fitis	15
Wilde Eend	>10	Koekoek	2	Tjiftjaf	9
Kuifeend	2	Winterkoning	11	Staatmees	1
Nijlgans	1	Heggenus	3	Koolmees	7
Sperwer	1	Zanglijster	2	Matkop	3
Buizerd	1	Merel	8	Pimpelmees	5
Fazant	4	Roodborst	6	Rietgors	1
Waterhoen	5	Kleine karekiet	4	Zwarte Kraai	2
Meerkoet	11	Bosrietzanger	1	Ekster	3

*De Gierzwaluw 34 (1996), nr. 4*

Grote B. Specht	1	Zwartkop	1	Vlaamse gaai	2
Houtduif	4	Tuinfluitter	10		

Ook de aangrenzende noordelijke oeverlanden van de Kleine Poel werden onderzocht. Dit voor het overige vergelijkbare stukje laagveen is deels in gebruik als weiland, waar soorten als Slobeend, Kievit en Scholekster huizen. De aanwezigheid van bredere rietkragen resulteert in een tiental territoria van de Kleine Karekiet. Buizerd en Sperwer laten het hier nog afweten, maar daar staat tegenover dat in het meer open terrein een Ransuil de druk van de talloze bosuilen in het aangrenzende bos weet te weerstaan. Merkwaardig is dat de ratio Zwartkop-Tuinfluitter hier 6:7 is tegen 1:10 om de hoek. Ook hier is de Matkop duidelijk aanwezig met 2 territoria. Er werden 31 soorten geconstateerd met in totaal 127 territoria.

Tabel 2 Broedvogelinventarisatie noordelijke oeverlanden Kleine Poel 1996

Fuut	2	Ransuil	1	Tuinfluitter	7
Wilde eend	>10	Boerenzwaluw	2	Fitis	12
Slobeend	1	Koekoek	1	Tjiftjaf	3
Kuifeend	4	Winterkoning	8	Koolmees	6
Nijlgans	2	Heggenus	3	Matkop	2
Fazant	3	Zanglijster	2	Pimpelmees	2
Waterhoen	7	Merel	5	Rietgors	2
Meerkoet	13	Roodborst	3	Ekster	1
Kievit	3	Kleine Karekiet	10	Vlaamse gaai	1
Scholekster	2	Bosrietzanger	1		
Houtduif	2	Zwartkop	6		