

---

## Deelname gevraagd:

### SLAAPPLAATSTELLING AMSTERDAMSE HALSBANDPARKIETEN

---



FOTO: JIP LOUWE KOOIJMANS

De Halsbandparkiet broedde in 1968 voor het eerst in Nederland in het Haagse park Ockenburgh. In Amsterdam werd het eerste broedgeval geconstateerd in 1977. Daarna heeft de vogel zich verder over de Randstad verspreid (zie kadertekst). SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft 2004 uitgeroepen tot het 'Jaar van de Halsbandparkiet'. Dat houdt in dat iedereen, die een Halsbandparkiet heeft gezien, gevraagd wordt deze door te geven op de speciale SOVON-website ([www.sovon.nl](http://www.sovon.nl)). Tot nu toe hebben al enkele honderden waarnemers een of meer Halsbandparkieten doorgegeven.

SOVON is van plan om donderdag 11 of vrijdag 12 november (de exacte datum is nog niet bekend!) een landelijke en simultane slaapplaatstelling te organiseren. Om een zo compleet mogelijke telling te krijgen is het noodzakelijk om op alle bekende (en wellicht nog niet eerder bekende) slaappleaatsen in Amsterdam (en Nederland) op hetzelfde moment te tellen. De slaappleaatsstellingen van Halsbandparkieten vormen een mooie aanvulling op de landelijke broedvogeltelling 1998-2000. Omdat in het najaar en de winter alle exemplaren op de slaappleaats aanwezig zijn, en tijdens het broedseizoen vermoedelijk alleen de niet-broeders, is het mogelijk op grond van de slaappleaatsstellingen een schatting te maken van het aantal broedparen. Aan de hand van deze simultaantelling wordt een goed beeld gekregen van het daadwerkelijke aantal Halsbandparkieten in Amsterdam en Nederland.

De KNNV afdeling Amsterdam en de Vogelwerkgroep Amsterdam zijn door het SOVON benaderd om aan deze telling hun medewerking te verlenen.

Als je interesse hebt en mee wilt doen aan de Amsterdamse nachtelijke simultane slaappleaatsstelling Halsbandparkieten op donderdag 11 of vrijdag 12 november (precieze datum wordt nog bekend gemaakt), geef je dan op!

---

Geïnteresseerde tellers kunnen zich aanmelden bij:

Vogelwerkgroep Amsterdam: Jip Louwe Kooijmans, 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl

KNNV afdeling Amsterdam: Geert Timmermans, 020-6630237, harmat4@xs4all.nl

**De Halsbandparkiet** *Psittacula krameri* broedt van nature in de droge savanne en het laaglandregenwoud van noordelijk tropisch Afrika en Zuidwest-Azië. Als gevolg van introducties en ontsnaptingen heeft de soort zich op veel plaatsen buiten het normale verspreidingsgebied gevestigd, waaronder in Nederland. Het voedsel bestaat uit allerlei vruchten, zaden, knoppen en bloemen. Koude winters vormen geen probleem, zolang er maar voedsel beschikbaar is. In Europa zijn deze vogels 's winters dan ook mede afhankelijk van bijvoederen.

#### **Voorkomen**

In Nederland komen Halsbandparkieten sinds het midden van de jaren zestig voor, altijd in de menselijke omgeving zoals stadsparken. Ze nestelen gewoonlijk in holtes van oude bomen in parken en lanen, hoewel sommige paren tot broeden komen in grote nestkasten, misschien zelfs in muurnissen. Geruchten dat Halsbandparkieten schadelijk zijn voor de inheemse vogelstand (nesten inpikken van Grote Bonte Specht e.d.) zijn onvoldoende onderzocht. Een deel van de vogels verblijft de hele dag in de directe omgeving van de broedplaats terwijl een ander gedeelte zich verspreidt over woonwijken in de wijde omtrek.

Dankzij de karakteristieke luide (vlucht)roep zijn Halsbandparkieten gemakkelijk te lokaliseren. Dat het aandeel zekere broedgevallen in ons land vrij laag ligt is opmerkelijk, aangezien Halsbandparkieten opvallend gekleurd, groot en weinig schuw zijn. Amsterdam en Den Haag vormen kerngebieden met relatief grote broedpopulaties. Daarnaast zwerven kleinere groepen reeds jaren rond in bijvoorbeeld Haarlem en Rotterdam. Het opduiken van Halsbandparkieten is echter beslist geen garantie voor permanente vestiging, ook niet in ogenschijnlijk geschikt gebied. Pas sinds de jaren negentig lijken Halsbandparkieten langzaam uit te waaiëren vanuit de kerngebieden naar de omgeving, maar over een populatie-explosie kunnen we nu nog niet spreken.

#### **Aantallen**

In 1996 werd in Amsterdam het aantal broedparen op 16-50 geschat (Timmermans, 1996). Aan het einde van de jaren negentig werd de totale populatie in Nederland geschat op ongeveer 1000 exemplaren, waaronder 150 broedparen. Deze laatste schatting is te laag. In het voorjaar 2000 waren er zowel in Amsterdam als Den Haag ongeveer 100 broedparen (Keijl, 2001). De aantallen elders in het land (Haarlem naar schatting 7 paren, Rotterdam 8 en Apeldoorn 2) dragen nauwelijks bij aan de totale populatie, die voor 2000 is geschat op 220 broedparen (Keijl, 2002).

#### **Literatuur**

Keijl, G.O., 2001. Halsbandparkieten in Amsterdam, 1976-2000, *Limosa* 74: 29-32.

Keijl, G.O., 2002. Halsbandparkiet. In: Husting, F. & J. Vergeer (red.) *Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000*: pag. 268-269.

Timmermans, G., 1996. Halsbandparkiet. In: Melchers, M. & R. Daalder (red.). *Sijsjes en drijsijsjes, de vogels van Amsterdam*: pag. 117-118 en pag. 236.