

Do 30 april Koosje en K2 zitten aanvankelijk met zijn tweeën op de rand van het nest en voeren de jongen. Daarna vliegen ze weg naar Hoogkade. Ze strijken vandaar neer op het dak van het SHB-gebouw. Op het dak heeft iemand brood gestrooid. Ze pakken het in hun bek en lopen naar een plasje water wat op het dak is achtergebleven. Het brood wordt geweekt in het plasje. Ze maken er een babypapje van en ze stoppen het vervolgens in hun krop. Ze vliegen naar de platanen. Na een kwartiertje vliegen ze naar het nest en gaan ze de jongen voeren. De jongen worden met de nacht groter. Nu steken ze al met hun kop boven Koosje uit, wanneer die op het nest zit. Als de volwassen kraaien niet op het nest zitten, kan ik echter nog geen jongen zien. Na het voeren blijft K2 op de iets hogere tak bij het nest zitten en Koosje blijft op de rand van het nest.

Na Pinksteren zie ik op **woensdag 20 mei** nog maar één jong:

's Ochtends vroeg zie ik tot mijn schrik slechts één groot jong op de rand van het nest staan. Ben je even weg, mis je weer van alles! Zijn de andere twee jongen uitgevlogen, zitten ze ergens anders in de boom, zijn ze dood? Ik weet het niet. Besluit om het ene nog resterende jong Karelkje te noemen. Het kan natuurlijk net zo goed een vrouwtje zijn, maar ik beschrijf hem als van het manlijke geslacht.

6.15 uur. Karelkje (het jonge kraaitje) zit op de rand van het nest. K2 zit op de tramleiding.

7.50 uur. Karelkje op nest.

14.00 uur. Koosje voert Karelkje en voert poepje af.

14.10 uur. Karelkje slaat zijn vleugels uit, Hup, hup, hup, hup! roep ik enthousiast. Het helpt niet, ten eerste kan hij mij niet horen en ten tweede ben ik even vergeten dat jonge vogels eerst hun vliegspieren moeten trainen voordat ze hun eerste vlucht kunnen maken.

18.30 uur. Karelkje loopt over de rand van het nest, ik ben bang dat ie eraf kukelt. Dat valt gelukkig mee. Hij poetst en slaat daarna zijn veren uit.

Vanaf Hemelvaart 21 mei ben ik tien dagen op vakantie. Ik ben gestopt met mijn kraaiennestblog. Als ik terug kom staat de nestboom vol in blad. Ik zie alleen Koosje en K2 op het dak van de Hoogkade. Van Karelkje geen spoor.

Pas na een week zie ik Karelkje terug. Hij zit bij zijn ouders op de Hoogkade. Karelkje is makkelijk te herkennen aan de witte schouderveren. Hij lijkt op zijn vader; hij loopt ook een beetje mank en is mager. Hopelijk haalt hij het volgende jaar.

Vogelreis naar Suriname

Ricardo van Dijk & Martijn Voorvelt

Van 13 februari tot 2 maart 2009 organiseerde Jan Timmer een reis naar Suriname voor leden van de Vogelwerkgroep en de KNNV Amsterdam. Dit verslag geeft een weergave van deze reis, vol vogels en indrukken.



*Swallow-tailed Kite,
Pakuli River*

Commewijne (dag 1-2)

Na een lange vlucht met SLM landen we aan het einde van de middag op het vliegveld van Paramaribo. Na wat kruiers van ons afgeschud te hebben, nemen we even de tijd om de eerste vogels om ons heen waar te nemen. Op een grasveld zien we Yellow-rumped Caciques en er vliegen Fork-tailed Palm Swifts en Orange-winged Amazons over. We maken kennis met onze vogelgids, Otte Ottema, die al meer dan tien jaar voor de Surinaamse natuurbeschermingsorganisatie STINASU werkt. Otte is een opmerkelijke verschijning in een camouflagedpak met korte broek en lange baard.

We vertrekken naar Commewijne en zien onderweg Cattle Egrets en een Pied Water-Tyrant. In het donker komen we aan op De Plantage, dat bestaat uit een aantal lodges en een restaurant. Tijdens de eerste nacht horen we het angstaanjagende geluid van Guianan Red Howler Monkeys (Brulapen) en dat zou vrijwel de gehele reis zo blijven. Ook is er een Striped Owl gehoord. In het eerste ochtendlicht in Suriname is het uiteraard spannend wat we te zien zullen krijgen. Bij de lodges broedt een paartje Violaceous Euphonia en bij Jan vliegt er zelfs een Silver-beaked Tanager tegen zijn borst. Op deze voormalige plantage is een ruime tuin aanwezig, een kreek en een stuk bos. Bij de kreek zien we een Green-and-rufous Kingfisher. Na het ontbijt gaan we met een locale gids het bos in. Het vogelen is hier behoorlijk lastig omdat veel vogels hoog in de bomen zitten. Aan de rand van het bos zien we een paartje White-browed Antbird en een White-winged Becard. We vogelen nog wat in de tuin met een Pygmy Kingfisher en een Hooded Tanager en zien onze eerste toekanachtige, de Black-necked Araçari. In de middag begint het te regenen en het zou niet meer ophouden. Vanuit het restaurant vullen we de lijst aan met een Long-winged Harrier en enkele Squirrel Monkeys (Doodshoofdaapjes).



White Hawk met een reptiel als prooi, Pakuli



Guianan of Arrowhead Piculet, Commewijne



Swallow-winged Puffbird, Foengoe Island

Commewijnerivier Et Overbridge (dag 3)

In de ochtend is het droog en pakken we snel de kans om nog even op het terrein te vogelen. We bezoeken een stukje dat lekker rommelig is; beetje kaalslag, beetje landbouw en een mooie bosrand.

Als snel zien we een baltsend paartje Black-capped Donacobius dat ons komt bekijken. Daarna volgt onze eerste grote papegaai, de Chestnut-fronted Macaw en een typische graslandsoort, de Chestnut-bellied Seedeater. Dan vliegt er iets vreemds over. Het blijkt een Bare-necked Fruitcrow te zijn, behoorlijk zeldzaam voor Suriname.

We vertrekken vanaf De Plantage en na een korte busreis stappen we op een kleine boot om de Commewijnerivier af te zakken. Het is een getijdenrivier en dat betekent dat er langs de rand slikranden droog komen te liggen, wat veel vogels aantrekt. Als snel zien we veel reigers, waaronder Little Blue Herons, Tricoloured Herons en een Snowy Egret. Ook zien we de schuwe Scarlet Ibis. Naarmate we de monding van de rivier naderen, verschijnen er kustvogels als Laughing Gull, Royal Tern en Large-billed Tern. Een beetje lastig vanuit de boot zijn kleinere soorten als Spotted Sandpiper, Black-bellied Plover en Semipalmated Plover. Helaas begint het weer te regenen en moeten we het doen met enkele Ospreys en een Peregrine Falcon die een prooi op een lichtmast aan het plukken is. We besluiten terug te varen en na enig zoeken door de schipper krijgen we een groep Amazon River Dolphins (Amazonedolfijnen) te zien. Nadat we zijn aangemeerd gaan we naar het STINASU kantoor, waar we een bus aantreffen die volledig is volgepakt met eten en kookspullen om de gehele groep voor meer dan een week van voedsel te voorzien. Onze kok John gaat vanaf hier met ons mee en we vertrekken naar het Overbridge River Resort. Onderweg zien we enkele Jacana's in een sloot. Na lang over onverharde wegen te hebben



Scarlet Ibis, aan de kust bij Weg naar Zee



gereden, komen we tegen het einde van de middag aan. In het laatste licht wordt nog even gevogeld, wat een Yellow Warbler oplevert, een wintergast uit Noord-Amerika.

Powakka (dag 4)

Deze ochtend vertrekken we vroeg naar een savannegebied bij Powakka. Het bestaat grotendeels uit hoge struiken die altijd bladdragend zijn en dat maakt het vogelen soms een tikkeltje lastig. De savanne herbergt een aantal specifieke soorten zoals Trush-like Schiffornis en Rufous-crowned Elaenia. Verder zien we een Barred Antshrike en de prachtige Bronzy Jacamar. We gaan terug en lopen een bosbouwpad in. Plots duikt Otte de bosjes in en maant ons te volgen. We zijn aangekomen op een baltsplaats van de Saffron-crested Tyrant-Manakin. Met behulp van geluid krijgen we de soort snel te zien. Een Spotted Puffbird komt nieuwsgierig kijken.

We gaan weer verder over de wegen van rode klei. Bij een ontbost stuk land bekijken we de kruinen van fruitdragende bomen. Dat trekt veel vogels aan; we zien Red-bellied Macaw, Red-throated Caracara en Finsch's Euphonia.

Het wordt tijd om richting de Brownsberg te gaan. We rijden via de route door het oerwoud die ook gebruikt wordt door de vrachtwagens van de aluminiumfabriek Suralco. We komen na enige tijd in een file terecht van busjes en vrachtwagens; er schijnt een probleem te zijn. Er is een enorme kuil in de weg, zó groot dat de vrachtwagens die er in rijden door een bulldozer omhoog geduwd moeten worden. Een grote groep gestrande automobilisten discussieert als beste stuurlied aan wal over de juiste oplossing. Na een tijdje besluit de bulldozer-chauffeur de kuil te gaan vullen met grind. Meteen pakt Raymond, onze buschauffeur, zijn kans om met een flinke aanloop door de kuil heen te rijden. Al met al zorgt dit voor twee uur oponthoud. Eenmaal onderweg schiet een Little Tinamou over de weg en we zien de eerste Braziliaanse Agouti, een knaagdier. Het kamp op de Brownsberg ligt bovenaan deze berg. We moeten daar met de bus zien te komen via een steil, onverhard pad dat behoorlijk slecht is geworden door de regenval. We klimmen omhoog en we klampen ons goed vast in de bus. Na een paar kilometer komt er een tegenligger en moet de bus achteruit. We glijden gevaarlijk dicht naar de rand van het pad en de actie heeft als gevolg dat de koppeling verbrandt. Raymond vraagt ons verder te voet te gaan en nadat de bus is afgekoeld, komt ook deze op de berg aan.

Brownsberg (dag 5-6)

Het inmiddels vertrouwde geluid van de Brulaap luidt de ochtend in. Al snel volgt de ietwat zeurderige zang van de White-necked Thrush. Omdat de elektriciteit nog is uitgeschakeld moeten we op de tast douchen. De wc dient te worden doorgespoeld met een zelf te vullen emmer. Maar wat geeft het, later zal het allemaal nog veel primitiever worden.

De eerste wandeling door het natuurpark brengt ons langs een rondscharrelende Agouti. Rinkelende Golden-winged Parakeets vliegen over. Bij een kolonie Green Oropendola's horen we roepjes van White-throated Manakins en het Boomleeuwrikachtige liedje van een Ferruginous-backed Antbird, al snel gevolgd door geluiden van andere oerwoudvogels: White-throated en Channel-billed Toucans en de alomtegenwoordige Screaming Piha.

Hier maken we kennis met het even fascinerende als frustrerende verschijnsel *mixed species flock*: zwermen van foeragerend rondbuitelende zangvogels, met vaak wel tien of meer verschillende soorten door elkaar, niet zelden in de hoge boomkruinen. Onze eerste kleine *flock* zit gelukkig op ooghoogte en bevat Golden-headed Manakins, een Fork-tailed Woodnymph (een kolibriesoort) en een Wedge-billed Woodcreeper. Laatstgenoemde is hier een van de algemeenste soorten woodcreepers, vogels die over boomstammen omhoog kruipen en veelal verschrikkelijk veel op elkaar lijken. De Wedge-billed is echter gemakkelijk te herkennen aan zijn kleine wipsnaveltje. Naast de woodcreepers zijn het vooral de antbirds (miervogels) waaraan we moeten wennen. Er leven tientallen soorten van in Suriname, bijna allemaal verborgen in de schaduwen van het regenwoud. Gelukkig hebben we Otte bij ons, die de geluiden kent en zijn best doet om diverse soorten naar ons toe te lokken. Deze ochtend lukt dat prima met een Black-headed Antbird en een mooie Cinereous Antshrike. Twee algemene soorten, zo blijkt al spoedig, net als bijvoorbeeld de Mouse-coloured Antshrike met zijn geinige deuntje.

Het hoofddoel van de eerste ochtend is de vreemde, zeldzame Sharpbill, een groen acrobaatje met een geluid als een piepende deur. Het lukt ons om af en toe een glimp van een fladderende Sharpbill in de hoge boomkruinen op te vangen. Terwijl me met pijn in de nek terugwandelen zien we vogels als Fulvous Shrike-Tanager, Plain-brown Woodcreeper en Coraya Wren. Ellen en Ricardo vinden zowaar een Guianan Red Cotinga, een zelden waargenomen vogel.

De tocht die volgt is vol verrassingen. Neem de Musician Wren, een winterkoning die klinkt als een opgewekt fluitende wandelaar. Of de rood-geel-zwart-gestreepte Onechte Koraalslang. Of een fenomeen als de "mierentuin": een bolvormig tuintje aan een boomtak, vervaardigd door agrarisch aangelegde mieren die hun nest bouwen door aarde en zaden de boom in te sjouwen.

Op de middag voor ons vertrek laat Otte ons ook een lek (baltplaats) van Eastern Long-tailed Hermits zien; mede dankzij de laserprijs van Jan kunnen we een zingend mannetje van deze forse kolibriesoort bewonderen. Verderop ontdekken we twee stemmig donkergrijze vliegenvangers met witte keeltjes. De dag ervoor hebben we er nog tevergeefs naar gezocht. Ze doen Otte euforisch uitroepen: "Wow! White-throated Pewees! Voor het eerst sinds vijf jaar weer waargenomen op de Brownsberg!" We blijven nog lang kijken naar deze amusante vogels.

Op weg naar Boven-Coesewijne (dag 7)

Met door Loes en Frans schoongelapte busraampjes rijden we de berg af. We zijn op weg naar Pakuli Landing, een nog vrij nieuwe en onbekende lodge aan de Coesewijnerivier. De ramen mogen dan schoon zijn, de koppelingsplaat van het busje heeft een flinke opdoffer gehad van de

Brownsberg-beklimming. Na een paar uur rijden kan alleen de eerste versnelling nog maar gebruikt worden. Een vervangende bus was al besteld maar blijkt niet op de juiste plaats klaar te staan: die moet uit Paramaribo komen. Onze dappere, oranje bestofte bus komt tot stilstand langs de weg richting Zanderij. We zullen moeten wachten.

Dat vindt niemand trouwens erg, want John heeft een heerlijke lunch bereid, en bovendien blijken zich op deze plek veel bijzondere vogels te bevinden. Een groepje bomen herbergt een Short-crested Flycatcher en twee Burnished-buff Tanagers. Een Cayenne Jay komt op twee gevangen soortgenoten af. Aan de overkant van de weg vinden we Plain-breasted Ground-Doves en zingen Blue-black Grassquits hun ultrakorte liedjes terwijl ze zichzelf als zwarte flipperkastballetjes omhoog katapulteren.

Als de nieuwe bus arriveert, vervolgen we onze weg. Langzaam verandert het landschap. Die middag hotsebotsen we door eindeloze savannes, waarboven Red-shouldered Macaws naar hun slaapplek zwermen. Een Solitary Sandpiper heeft een regenplas op de weg als zijn domicilie gekozen; we zullen hem de komende dagen nog vaak moeten pesten.

Boven-Coesewijne (dag 8-10)

Pakuli Landing: een paradijsje in het bos aan de rivier. Sommigen van ons slapen er samen met vleermuizen in een huisje. De andere helft brengt de nacht door in hangmatten. We worden wakker met de spookachtige fluittonen van Great en Variegated Tinamous en het knusse gebabbel van de Red-rumped Caciques boven ons hoofd. De boom waarin de caciques hun hangnest-kolonie hebben gevestigd trekt continu kolibries aan: White-necked Jacobins met hun witte buiken, donkere Blue-tailed Emeralds en zelfs het groen-rode dwergje met de naam Tufted Coquette. Een andere vaste klant is de luidruchtige Red-fan Parrot. Het steeds herhaalde "pieoewu" van de Purple-throated Fruitcrows blijft al snel in onze kop zitten.

Omdat de enige aanwezige boot te klein is voor de hele groep splitsen we: de eerste dag in Boven-Coesewijne zal de ene helft gaan varen (met Otte) terwijl de andere helft (met Jan) de savanne zal verkennen. Helaas begint het al snel weer te plenzen. De bootpassagiers keren als verzopen katjes terug, met gescheurde poncho's en weinig waarnemingen. Twee dagen later krijgen zij een herkansing, waarbij ze beloond worden met de spectaculaire Sunbittern en maar liefst acht Amazonian Manatees (Amazonelamantijnen). Op hun savannetochten mogen zij de zeldzame Plumbeous Seedeater bijschrijven.

De andere groep ziet langs de Coesewijne onder meer een Sungrebe, een White-necked Puffbird en de sporen (luchtballetjes) en neus van één



Smooth-billed Ani, Pakuli River

lamantijn. Alle vijf voorkomende ijsvogelsoorten worden door beide groepen waargenomen. De groep van Jan kan op de savanne weliswaar geen zeldzame seedeater vinden, maar wel onder meer twee Variegated Flycatchers, een Wedge-tailed Grass Finch en een Ruby Topaz Hummingbird. Op de 'natte savanne' valt in de motregen te genieten van de leuke vegetatie (zonnedauw), zang van de algemenere seedeater-soorten en de sporen van een Jaguar. Bovendien is het goed terugwandelen langs het pad door het Pakuli-bos, waar we bizarre bijen- en wespennesten bewonderen en mooie vogels als Spotted en Flame-crested Tanager uit wriemelige *flocks* wringen.

Naar Foengoe Island (dag 11)

Deze ochtend worden we om zes uur gewekt door de roep van een Marbled Wood Quail. Ook een Tropical Screech Owl laat zich rond dit tijdstip nog horen met zijn zachte roep. Voor een deel van de groep komt de nieuwe bestemming als geroepen, want vier nachten in de hangmat onder een lek rieten afdak is niet iedereen goed bevallen. We pakken de spullen in en rijden voor de laatste keer over de savanne. In een winkel in Biki Poika, een houten keet met koopwaar en een verkoopster achter kippengaas, worden een tandenborstel en andere kleinigheden gekocht. Daarna vertrekken we naar het westen. De totale afstand over de weg naar Witagron bedraagt zo'n honderd kilometer. Het wegdek is de eerste veertig kilometer zo slecht, dat we hier al vier uur over doen. Hierdoor komen we krap in de tijd te zitten. We besluiten een korte stop te maken om te lunchen. We vinden een plekje langs een kreek en kijken ondertussen wat rond. We zien veel hagelpatronen op de grond en vinden schedels van een Agouti en een Great Curassow, aanwijzingen dat op deze plek regelmatig gestroopt wordt. Gaandeweg wordt de weg gelukkig beter. Om vier uur 's middags komen we aan in Witagron. De boot met alle bagage en proviand wordt propvol gestouwd en als we deze zien vertrekken, wordt er aan boord flink gehooisd om de boot drijvende te houden. Wij vertrekken in een boot met een grotere motor en varen in flink tempo naar Foengoe Island. Tijdens de tweeënhalf uur durende tocht zien we Blue-and-yellow Macaw en Black-collared Swallow. Vanaf de rivier zien we de Voltzberg liggen. We komen aan in de schemer. Voor het eerst sinds vier dagen is er weer Parbo-bier te krijgen; lauw, maar toch lekker. Bert en Martijn delen hun tweepersoonskamer met een vogelspin, die zij Victor noemen.



Pied Water Tyrant, Weg naar Zee



Guianan Cock-of-the-Rock, baltsplaats Voltzberg

Voltzberg (dag 12-14)

Voor het verblijf op de Voltzberg moet er voor twee dagen eten en drinken mee, inclusief de kookspullen van de kok. Al deze spullen worden vooraf gewogen. Sommige van de ingehuurd dragers krijgen een rugzak van maar liefst veertig kilo mee. Omdat de lokale gemeenschap van dit soort klusjes leeft, is de betaling en de verdeling van het werk een belangrijke zaak, waarover eerst onderhandeld moet worden. Dat zorgt er voor dat we niet eerder dan negen uur vertrekken richting Voltzberg.

Na tien minuten varen komen we bij het startpunt van de wandeltocht. De dragers lopen flink door en leggen het traject in slechts anderhalf uur af. Wij doen er vijf uur over, want we stoppen regelmatig voor vogels en regenbuien. Met behulp van lokgeluiden zien we de White-flanked Antbird. Langs het pad bevinden zich grote gaten in de grond. Wilfried, de gids, vertelt dat dit een schuilplaats is van de Giant Armadillo, het Reuzengordeldier. Deze leeft samen met de Bushmaster, een dodelijke slang die het hol verdedigt. Een paar honderd meter voordat we het hangmattenkamp annex onderzoekstation bereiken, komen we op een kaal granietplateau. Hier doemt de Voltzberg als een steile wand voor ons op.

Het kamp bestaat uit een solide houten gebouw en een houten plee waar zich onder het deksel bijzonder grote sprinkhanen bevinden. Voordat het donker wordt lijkt het handig alvast de hangmatten, die door de dragers zijn meegenomen, op te hangen. De hangmatten zijn er, maar de touwen waarmee ze bevestigd worden ontbreken en de dragers zijn inmiddels al vertrokken. Op de grond slapen is hier geen optie, en gelukkig krijgen we op creatieve wijze met de gehalveerde toch nog gevonden touwtjes de hangmatten alsnog hangend.

Om vijf gaat uur de wekker. Het is de bedoeling om in het donker de Voltzberg te beklimmen, een hoogteverschil van 240 meter, en op de top de zonsopkomst te beleven. Wilfried gaat voorop. De klim is vrij pittig en bij het bereiken van de top begint hij juichend te schreeuwen, ondertussen wild met zijn armen zwaaiend. Hierdoor wordt de doelsoort, de Cliff Flycatcher, meteen verjaagd. Dat is een grote domper, en het wordt er niet beter op; de top blijft door het bewolkte weer in nevelen gehuld.

Ondertussen zijn Ellen en Ricardo met Otte aan het vogelen op het plateau. Ze zien Lilac-tailed Parrotlet, Red-shouldered Tanager, Green Araçari en Chapman's Swift. Later worden met de hele groep mooie waarnemingen gedaan van Scarlet Macaw en White-bearded Manakin.

Na de lunch ondernemen we een wandeltocht naar de grootste bekende baltsplaats van één van de mooiste maar ook mafste soorten van de reis, de Guianan Cock-of-the-Rock. Het aantal mannetjes van deze lek bedraagt circa zestig exemplaren. Na een klein uur lopen vanaf het hangmattenkamp bereiken we de lek, die voor toeschouwers wordt afgeschermd door een touw. Als snel zien we de mannetjes heen en weer fladderen en sommigen komen nieuwsgierig kijken. De afstand tussen mens en vogel is soms niet meer dan vier meter. We nemen ongeveer twintig mannetjes en een enkel vrouwtje, bruiner van kleur, waar.

De volgende ochtend op het plateau levert Cayenne Jay, Pompadour Cotinga en een prachtig overvliegende Black-and-white Hawk-Eagle op. Om half twaalf zijn we terug bij het kamp voor een stevige lunch met bruine bonen. De Yellow-billed Jacamar die een dag eerder bij "de badkamer" (de kreek langs het kamp) is gezien, laat zich mooi filmen en fotograferen.

Aan het begin van de middag beginnen we aan de wandeltocht terug naar de rivier. Een Blue-crowned Motmot komt boven onze hoofden zitten. Na het gebruik van Iokgeluiden hebben enkelen van ons het geluk om een Rose-breasted Chat te zien, een behoorlijk schaarse soort.

We komen onderweg twee keer een groep trekmiere tegen. Deze mieren vreten onderweg alles op wat ze tegenkomen. Ze kunnen van belang zijn voor onze vogellijst, want met hun agressieve gedrag jagen ze insecten op waarop veel vogels afkomen. We proberen erachter te komen of de trekmiere vergezeld worden door vogels, maar dat lijkt niet zo te zijn. We moeten nu de trekmiere zien te passeren, terwijl ze over het bospad marcheren. Daar is maar één manier voor: een aanloop nemen en zo snel mogelijk over de groep mieren heen rennen totdat je de stroom gepasseerd bent. Martijn en Rob lopen alsnog een paar flinke beten op. De rest van de tocht blijven we zeer alert op deze venijnige bijtertjes.

De tocht begint wat zwaar te worden en niet iedereen houdt hetzelfde tempo aan, vooral niet vanwege de krekken die we moeten oversteken. Bij de rivier is geen boot te zien, maar daar is een oplossing voor. Ergens ligt een portofoon verstopt en Wilfried roept daarmee een boot op die vervolgens binnen tien minuten arriveert. Als we aankomen op Foengoe, wacht een deel van de groep ons op met een Parbo in de hand. Na drie dagen rimboe, insecten, hitte en alleen water en limonade, springen we de boot uit en zetten onze mond aan het bier. Die nacht slapen we gelukkig weer in een bed. Victor stelde onze aandacht blijkbaar niet op prijs; hij is verdwenen.

Foengoe Island Et Paramaribo (dag 15)

Omdat er nooit voor tieneen vliegtuig landt op Foengoe, hebben we een paar uur tijd om over de airstrip te lopen. Het gebied blijkt goed te zijn voor papegaaien en toekans, en enkele nieuwe soorten voor de trip zoals Violaceous Trogon en Black-crowned Tityra. Een vrouwtje Hook-billed Kite zorgt voor wat verwarring want ze ziet er uit als een kruising tussen een Buizerd en een papegaai. Na het ontruimen van de kamers maken we nog een korte wandeling en doen een poging om de Capuchinbird te horen. Na het afspelen van het geluid lijkt er heel ver een antwoord te komen; de roep is slechts zwakjes te horen. Wel horen we duidelijk een Great Jacamar. Om half twaalf proberen we met een bootje nachtzwaluwen te vinden die mogelijk langs de oever van een eilandje voor het kamp zitten. Ze laten zich helaas niet zien.

Voordat we onder een houten afdakje wachten op het vliegtuig dat ons vanaf de airstrip naar Paramaribo zal vliegen, moeten we eerst op de weegschaal staan met de eigen bagage erbij. Alles wordt bij elkaar opgeteld en we kunnen zonder probleem mee. Om kwart over drie horen we de DHC-6 Twin Otter aankomen. Na het inladen van alle bagage, inclusief John en zijn kookspullen, stijgt het vliegtuigje met flinke kracht op. Onderweg zien we een King Vulture. Na drie kwartier vliegen komen we aan op vliegveld "Zorg en Hoop", door Tobias ook wel "Kommer en Kwel" genoemd.

Eco Resort Inn ligt naast het STINASU kantoor En is voor Surinaamse begrippen een groot en luxe hotel. Het heeft een tuin die aan de Surinamerivier grenst. We bekijken er de avondtrek van reigers en zien een Limpkin.

Peperpot Et Cultuurtuin (dag 16)

Door het dichtbegroeide Peperpot, een oude plantage die al tientallen jaren niet meer in gebruik is,

loopt een lang pad, waarlangs de vogels zich moeilijk laten zien. Toch kunnen we nog nieuwe soorten bijschrijven: Savanna Hawk en Blackish Antbird, Vanuit de begroeiing horen we Green Ibis roepen. De Cultuurtuin is een ietwat vervallen park waar vroeger veel bomen en planten uit Indonesië gepland zijn. Bij de ingang zien we een boom met grote rode bloemen waarop kolibries afkomen, waaronder de Glittering-throated Emerald. In een boom achter ons zit een Grey Kingbird.

Na een stukje lopen gaan we van het pad af een dicht bos in, waar we ons flink moeten insmeren met antimug-middel. Al snel zien we een mannetje Crimson-hooded Manakin, het doel van dit uitstapje in het bos. Er verschijnen nog meer exemplaren, maar de muggen drijven ons uiteindelijk toch het bos uit. We zien op de sportvelden enkele Red-breasted Blackbirds en een zeer grote hagedis die meer van een varaan weg heeft. Bij een plasje kijken we naar een alligator. Dan zien we een apart verschijnsel: een jonge Shiny Cowbird wordt gevoerd door een Southern House Wren! Deze cowbird vertoont hetzelfde broedparasitaire gedrag als van een Koekoek, maar behoort totaal niet tot de familie van de koekoeken.

We gaan weer terug naar het hotel en zijn daar om zes uur, zodat we nog een uurtje slaaptrek langs de rivier kunnen kijken. Er vliegen honderden reigers langs. Tijdens ons laatste gezamenlijke avondmaal vertelt iedereen zijn of haar persoonlijke hoogte- en dieptepunt van de reis. Voor sommigen is dit het zien of juist missen van een bepaalde vogelsoort, voor anderen een activiteit of ander reismoment.

Weg naar Zee (dag 17)

Deze ochtend is de laatste kans om de soortenlijst aan te vullen; we gaan naar de kust. Voor het vertrek wordt een Masked Yellowthroat in de tuin van het hotel gezien. We rijden langs het Onafhankelijkplein, waar de zondagse vogelzangwedstrijd wordt gehouden. Het aantal zangstrofen binnen een bepaalde tijd wordt geturfd en de vogel met het hoogste aantal is de winnaar. Het is een serieuze sport en Otte vertelt dat kampioenvogels 20.000 euro waard zijn. Terwijl we het gebeuren vanuit de bus bekijken, vliegen er twee Crane Hawks over.

We rijden verder via de Weg naar Zee, een lange weg door agrarisch gebied. We zien hoe drie Yellow-headed Caracara's op een aantal koeien gaan zitten. Langs de weg zien we veel Snail Kites en enkele Yellow-hooded Blackbirds. We komen aan bij de kust. Op deze plaats is een Hindoestaans crematorium. De stapels brandhout zijn een bijzonder gezicht; Hindoes verbranden hun overlevenden in de open lucht.

Het water is nog vrij hoog, maar na enig wachten wordt het eb en begint het droog te vallen. Al snel ziet het rood-wit-blauw van de Rode Ibissen en witte en blauwe reigers. Kleine steltlopers zoals Least en Semipalmated Sandpiper zijn lastig te determineren in hun winterkleed. Een strandloper is gemerkt door een gele "flag" met een inscriptie aan zijn poot, waarschijnlijk van een Amerikaans ringproject.

Tussen het slik zoekt een Rufous Crab Hawk zijn maaltje bij elkaar. Terug langs de weg zien we vanuit de bus een Krabbenetende Wasbeer.

Na de lunch in het hotel is het tijd om de terugreis te aanvaarden.

Het was een intensieve maar zeer productieve reis met in totaal 367 vogelsoorten, zes apensoorten en heel veel soorten insecten, waaraan we nog vaak zullen terugdenken.

Alle foto's in dit verslag zijn gemaakt door Ricardo van Dijk (zie ook ricardovandijk.blogspot.com)

TINAMIDAE	39. White Hawk	74. Ruddy Turnstone
1. Great Tinamou	40. Black-collared Hawk	75. Least Sandpiper
2. Cinereous Tinamou	41. Rufous Crab Hawk	76. Semipalmated Sandpiper
3. Variegated Tinamou	42. Great Black Hawk	77. Whimbrel (Hudsonian Curlew)
4. Little Tinamou	43. Savanna Hawk	LARIDAE
5. Red-legged Tinamou	44. Black-and-white Hawk-Eagle	78. Laughing Gull
PODICIPEDIDAE	45. Long-winged Harrier	79. Large-billed Tern
6. Least Grebe	46. Crane Hawk	80. Royal Tern
ANHINGIDAE	PANDIONIDAE	COLUMBIDAE
7. Anhinga	47. Osprey	81. Scaled Pigeon
FREGATIDAE	FALCONIDAE	82. Pale-vented Pigeon
8. Magnificent Frigatebird	48. Barred Forest Falcon	83. Ruddy Pigeon
ARDEIDAE	49. Black Caracara	84. Plumbeous Pigeon
9. Cocoi/White-necked Heron	50. Red-throated Caracara	85. Common Ground Dove
10. Great Egret	51. Yellow-headed Caracara	86. Plain-breasted Ground Dove
11. Snowy Egret	52. Peregrine Falcon	87. Ruddy Ground Dove
12. Little Blue Heron	53. Bat Falcon	88. Blue Ground Dove
13. Tricoloured Heron	CRACIDAE	89. White-tipped Dove
14. Striated Heron	54. Little Chachalaca	90. Grey-fronted Dove
15. Cattle Egret	55. Marail Guan	PSITTACIDAE
16. Capped Heron	56. Blue-throated Piping Guan	91. Blue-and-yellow Macaw
17. Black-crowned Night Heron	57. Black Curassow	92. Scarlet Macaw
18. Yellow-crowned Night Heron	PHASIANIDAE	93. Red-and-green Macaw
19. Fasciated Tiger Heron	58. Crested Bobwhite	94. Chestnut-fronted Macaw
20. Rufescent Tiger Heron	59. Marbled Wood Quail	95. Red-bellied Macaw
THRESKIORNITHIDAE	ARAMIDAE	96. Red-shouldered Macaw
21. Green Ibis	60. Limpkin	97. White-eyed Parakeet
22. Scarlet Ibis	PSOPHIIDAE	98. Brown-throated Parakeet
ANATIDAE	61. Grey-winged Trumpeter	99. Painted Parakeet
23. Muscovy Duck	RALLIDAE	100. Green-rumped Parrotlet
CATHARTIDAE	62. Grey-necked Wood Rail	101. Golden-winged Parakeet
24. King Vulture	63. Ash-throated Crake	102. Lilac-tailed Parrotlet
25. Black Vulture	64. Russet-crowned Crake	103. Black-headed Parrot
26. Turkey Vulture	EURYPYGIDAE	104. Caica Parrot
27. Lesser Yellow-headed Vulture	65. Sunbittern	105. Blue-headed Parrot
28. Greater Yellow-headed Vulture	HELIORNITHIDAE	106. Dusky Parrot
ACCIPITRIDAE	66. Sungrebe	107. Orange-winged Amazon
29. Swallow-tailed Kite	JACANIDAE	108. Mealy Amazon
30. Grey-headed Kite	67. Wattled Jacana	109. Red-fan Parrot
31. Hook-billed Kite	CHARADRIIDAE	CUCULIDAE
32. Plumbeous Kite	68. Black-bellied Plover	110. Squirrel Cuckoo
33. Snail Kite	69. Semipalmated Plover	111. Little Cuckoo
34. Slender-billed Kite	SCOLOPACIDAE	112. Greater Ani
35. Double-toothed Kite	70. Solitary Sandpiper	113. Smooth-billed Ani
36. White-tailed Hawk	71. Lesser Yellowlegs	114. Striped Cuckoo
37. Roadside Hawk	72. Greater Yellowlegs	STRIGIDAE
38. Grey(-lined) Hawk	73. Spotted Sandpiper	115. Tropical Screech Owl

116. Crested Owl	157. Great Jacamar	199. Amazonian Antshrike
117. Amazonian Pygmy Owl	BUCCONIDAE	200. Dusky-throated Antshrike
118. Striped Owl	158. White-necked Puffbird	201. Cinereous Antshrike
CAPRIMULGIDAE	159. Spotted Puffbird	202. Pygmy Antwren
119. Lesser Nighthawk	160. Black Nunbird	203. Guianan Streaked Antwren
120. Pauraque	161. Swallow-winged Puffbird	204. Rufous-bellied Antwren
121. Blackish Nightjar	CAPITONIDAE	205. Brown-bellied Antwren
APODIDAE	162. Black-spotted Barbet	206. White-flanked Antwren
122. Chapman's Swift	RAMPHASTIDAE	207. Long-winged Antwren
123. Band-rumped Swift	163. Black-necked Araçari	208. Spot-tailed Antwren
124. Short-tailed Swift	164. Green Araçari	209. Todd's Antwren
125. Lesser Swallow-tailed Swift	165. Guianan Toucanet	210. White-fringed Antwren
126. Fork-tailed Palm Swift	166. Channel-billed Toucan	211. Ash-winged Antwren
TROCHILIDAE	167. Red-billed/White-throated Toucan	212. Dot-winged Antwren
127. Rufous-breasted Hermit	PICIDAE	213. Grey Antbird
128. Eastern Long-tailed Hermit	168. Guianan/Arrowhead Piculet	214. Dusky Antbird
129. Straight-billed Hermit	169. Golden-olive Woodpecker	215. Blackish Antbird
130. Little Hermit	170. Yellow-throated Woodpecker	216. White-browed Antbird
131. Reddish Hermit	171. Golden-green Woodpecker	217. Warbling Antbird
132. White-necked Jacobin	172. Waved Woodpecker	218. Black-chinned Antbird
133. Green-throated Mango	173. Cream-coloured Woodpecker	219. Black-headed Antbird
134. Black-throated Mango	174. Lineated Woodpecker	220. Silvered Antbird
135. Ruby Topaz	175. Golden-collared Woodpecker	221. Ferruginous-backed Antbird
136. Tufted Coquette	176. Blood-colored Woodpecker	222. Black-throated Antbird
137. Blue-chinned Sapphire	177. Crimson-crested Woodpecker	223. Spot-backed Antbird
138. Fork-tailed Woodnymph	178. Red-necked Woodpecker	224. Scale-backed Antbird
139. White-chinned Sapphire	FURNARIIDAE	FORMICARIIDAE
140. Green-tailed Goldenthrush	179. Plain-brown Woodcreeper	225. Black-faced Antthrush
141. Glittering-throated Emerald	180. Wedge-billed Woodcreeper	226. Rufous-capped Antthrush
142. Black-eared Fairy	181. Barred Woodcreeper	GRALLARIIDAE
TROGONIDAE	182. Straight-billed Woodcreeper	227. Variegated Antpitta
143. Black-tailed Trogon	183. Striped Woodcreeper	228. Thrush-like Antpitta
144. White-tailed Trogon	184. Chestnut-rumped Woodcreeper	TYRANNIDAE
145. Black-throated Trogon	185. Buff-throated Woodcreeper	229. Pied Water Tyrant
146. Violaceous Trogon	186. Lineated Woodcreeper	230. White-headed Marsh Tyrant
ALCEDINIDAE	187. Pale-breasted Spinetail	231. Sirostes
147. Ringed Kingfisher	188. Plain-crowned Spinetail	232. Tropical Kingbird
148. Amazon Kingfisher	189. Yellow-chinned/-throated Spinetail	233. Grey Kingbird
149. Green Kingfisher	190. Rufous-rumped Foliage-gleaner	234. Dusky-chested Flycatcher
150. Green-and-rufous Kingfisher	191. Cinnamon-rumped Foliage-gleaner	235. Variegated Flycatcher
151. Pygmy Kingfisher	192. Plain Xenops	236. Piratic Flycatcher
MOMOTIDAE	THAMNOPHILIDAE	237. Yellow-throated Flycatcher
152. Blue-crowned Motmot	193. Fasciated Antshrike	238. Boat-billed Flycatcher
GALBULIDAE	194. Black-throated Antshrike	239. Rusty-margined Flycatcher
153. Yellow-billed Jacamar	195. Black-crested Antshrike	240. Great Kiskadee
154. Green-tailed Jacamar	196. Barred Antshrike	241. Lesser Kiskadee
155. Bronzy Jacamar	197. Mouse-coloured Antshrike	242. Bright-rumped Attila
156. Paradise Jacamar	198. Eastern Slaty Antshrike	243. Cinnamon Attila

244. Greyish Mourner	289. Guianan Red Cotinga	328. Burnished-buff Tanager
245. Short-crested Flycatcher	290. Guianan Cock-of-the-Rock	329. Blue-grey Tanager
246. White-throated Pewee	OXYRUNCIDAE	330. Palm Tanager
247. Cliff Flycatcher	291. Sharpbill	331. Silver-beaked Tanager
248. Yellow-olive Flycatcher	HIRUNDINIDAE	332. Fulvous Shrike-Tanager
249. Yellow-margined Flycatcher	292. White-winged Swallow	333. White-lined Tanager
250. Grey-crowned Flycatcher	293. Grey-breasted Martin	334. Flame-crested Tanager
251. Yellow-breasted Flycatcher	294. White-banded Swallow	335. Fulvous-crested Tanager
252. Common Tody-Flycatcher	295. Black-collared Swallow	336. Red-shouldered Tanager
253. Spotted Tody-Flycatcher	296. Barn Swallow	337. Hooded Tanager
254. Double-banded Pygmy Tyrant	MIMIDAE	338. Black-faced Tanager
255. Helmeted Pygmy Tyrant	297. Tropical Mockingbird	CARDINALINAE
256. Pale-tipped Inezia	TURDIDAE	339. Blue-black Grosbeak
257. Yellow-bellied Elaenia	298. Pale-breasted Thrush	340. Buff-throated Saltator
258. Plain-crested Elaenia	299. Black-billed Trush	341. Greyish Saltator
259. Rufous-crowned Elaenia	300. Bare-eyed Trush	342. Slate-coloured Grosbeak
260. Forest Elaenia	301. White-necked Trush	EMBERIZIDAE
261. Yellow-crowned Elaenia	TROGLODYTIDAE	343. Plumbeous Seedeater
262. Southern Beardless Tyrannulet	302. Black-capped Donacobius	344. Wing-barred Seedeater
263. Slender-footed Tyrannulet	303. Coraya Wren	345. Ruddy-breasted Seedeater
264. Yellow-crowned Tyrannulet	304. Buff-breasted Wren	346. Chestnut-bellied Seedeater
265. Ochre-bellied Flycatcher	305. Southern House Wren	347. Blue-black Grassquit
TITYRIDAE	306. White-breasted Wood Wren	348. Grassland Sparrow
266. Cinereous Becard	307. Musician Wren	349. Wedge-tailed Grass Finch
267. White-winged Becard	SYLVIIDAE	COEREBIDAE
268. Pink-throated Becard	308. Collared Gnatwren	350. Bananaquit
269. Black-tailed Tityra	309. Long-billed Gnatwren	VIREONIDAE
270. Black-crowned Tityra	310. Tropical Gnatcatcher	351. Rufous-browed Peppershrike
271. Thrush-like Schiffornis	FRINGILLIDAE	352. Slaty-capped Shrike-Vireo
272. Cinereous Mourner	311. Finsch's Euphonia	353. Red-eyed Vireo
PIPRIDAE	312. Violaceous Euphonia	354. Lemon-chested Greenlet
273. Golden-headed Manakin	313. Golden-sided Euphonia	355. Ashy-headed Greenlet
274. White-crowned Manakin	PARULIDAE	356. Buff-cheeked Greenlet
275. White-fronted Manakin	314. Tropical Parula	357. Tawny-crowned Greenlet
276. Crimson-hooded Manakin	315. Yellow Warbler	ICTERIDAE
277. Blue-backed Manakin	316. Masked Yellowthroat	358. Shiny Cowbird
278. White-throated Manakin	317. Rose-breasted Chat	359. Giant Cowbird
279. White-bearded Manakin	THRAUPIDAE	360. Crested Oropendola
280. Black Manakin	318. Purple Honeycreeper	361. Green Oropendola
281. Saffron-crested Tyrant-Manakin	319. Red-legged Honeycreeper	362. Yellow-rumped Caciue
282. Tiny Tyrant-Manakin	320. Green Honeycreeper	363. Red-rumped Caciue
283. Wing-barred Piprites	321. Blue Dacnis	364. Yellow-hooded Blackbird
COTINGIDAE	322. Black-faced Dacnis	365. Yellow Oriole
284. Pompadour Cotinga	323. Paradise Tanager	366. Red-breasted Blackbird
285. Screaming Piha	324. Dotted Tanager	CORVIDAE
286. Purple-throated Fruitcrow	325. Spotted Tanager	367. Cayenne Jay
287. Capuchinbird	326. Turquoise Tanager	
288. Bare-necked Fruitcrow	327. Bay-headed Tanager	

Extra algemene ledenvergadering

Hanna Hirsch

Dit is een uitnodiging voor een extra ALV van de VWGA i.v.m. wijziging van artikel 3 van de statuten op **dinsdag 6 oktober 2009, 19.45 uur**, voorafgaand aan de lezing van Edia Dekker (Sporthof Wethouder Verheij, Polderweg 300). De statutenwijziging is noodzakelijk om bij beschermingsactiviteiten voldoende grondslag te hebben voor eventuele juridische acties. De statuten zijn op te vragen bij het secretariaat. Mocht niet tweederde van de leden aanwezig zijn, noodzakelijk bij een voorstel tot statutenwijziging, dan zal binnen een maand de statutair vereiste tweede algemene ledenvergadering plaatsvinden, voorafgaand aan de lezing van Ton Oudshoorn op **woensdag 4 november 2009, 19.45 uur**, locatie idem. Over het doorgaan van deze laatste vergadering, zie t.z.t. de website. Hieronder de tekst van Artikel 3, met de huidige tekst [OUD] en het voorstel voor de toekomstige tekst [NIEUW].

Artikel 3 : DOEL

1. De vereniging heeft ten doel:

- het verbreiden van kennis van de ornithologie in het bijzonder en van de natuurlijke historie in het algemeen en het aankweken van liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden, doch ook buiten de vereniging;
 - het steunen of ondersteunen, van acties, die kunnen leiden tot het oplossen van natuurhistorische vraagstukken;
 - [OUD] het steunen of ondersteunen van acties, in relatie tot de vogelstand, die gericht zijn op de bescherming van natuur en/of landschap;
[NIEUW] het tegengaan van ontwikkelingen en gebeurtenissen die een bedreiging voor vogels vormen, het voorkomen en waar nodig opheffen van voor vogels gevaarlijke situaties alsmede het geven van adviezen en het organiseren van activiteiten om de vogelstand en het welbevinden van vogels te bevorderen;
 - het samenwerken met andere personen en lichamen, die gelijk of aanverwant doel nastreven, ook buiten Nederland;
 - al hetgeen met een en ander in de ruimste zin verband houdt.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het bevorderen van de belangstelling voor de in het wild levende vogels door middel van studie en onderzoek;
 - [OUD] het houden van excursies;
[NIEUW] het houden van excursies en het organiseren van stadsvogeldagen en vrijwilligersacties;
 - het houden van ledenvergaderingen en contactavonden met voordrachten, bijdragen en demonstraties;
 - het uitgeven van een mededelingenblad;
 - het leggen van contacten met andere vogelwerkgroepen;
 - het informeren van organisaties en anderen over resultaten van eigen onderzoek;
 - [NIEUW] het overleggen met en het geven van advies aan instanties en personen over maai-, kap-, onderhouds- en bouwwerkzaamheden en andere voor vogels bedreigende situaties, zo nodig gevolgd door het instellen van bezwaar en beroep of civielrechtelijke procedures;
 - [was Artikel 3 g.] alle verdere geoorloofde middelen welke bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel van de vogelwerkgroep.