

De meeste vogels, die in 1953 nog niet en in 1964 wèl het eilandje bevolkten, zijn hiertoe gekomen doordat de ouder wordende aanplanting een gunstiger biotopp voor hen betekende. De achteruitgang van de tortelduif is nogal duister, die van de zwarte kraai wel begrijpelijk i.v.m. de kraaienjacht.

Het is natuurlijk wel grappig om de broedvogelbevolking van zo'n klein gebied te inventariseren en te vergelijken met die van een tiental jaren geleden, doch het heeft weinig nut als vergelijkingsmateriaal met andere boscomplexen. Beter is het een homogeen bosgebied te nemen, dat ongeveer 10 ha groot is, zoals aanbevolen door Prof. Dr. L. Tinbergen. Dit is zowel wat nauwkeurigheid als wat vergelijkbaarheid betreft de meest geschikte gebiedsgrootte voor dit werk.

Het is voor iedereen, die broedvogels gaat inventariseren, heel erg nuttig, zo niet noodzakelijk, eerst het boekje van Prof. Tinbergen te lezen getiteld "Vogels in hun domein". Dan kan men een nuttig gebruik maken van de ervaring van vele andere ornithologen, een ervaring die anders pas na vele jaren zèlf experimenteren kan worden opgedaan.

J. Reijnders.

adres; Nieuwe Meerdijk 382, Badhoevedorp.

VRAGENRUBRIEK:

(Vragen opgesteld door de Hr. de Kruyf)

- 1 Welke \hat{o} kiekendief heeft een zwarte vleugelstreep ?
 - 2 Noem 3 valkensoorten met baardstrepen.
 - 3 Is de φ sperwer groter of kleiner dan de \hat{o} ?
 - 4 Is de toppereend een Nederlandse broedvogel ?
 - 5 Noem het verschil van staart tussen grutto en rosse grutto ?
of Hoe kan men aan de staarttekening de grutto van de rosse grutto onderscheiden ?
-