

Sloterdijk, Januari t/m September 1964

(vgl. voor overzicht 1962/63 Mededelingenblad KNNV VWG Asd. 2e jaargang '64 No.1 blz.18-22)

Toevallige gasten.

Geen waarnemingen vonden plaats van de in het vorig overzicht als TG gequalificeerde soorten; parelduiker, purperreiger, krooneend, grote zee-eend, rotgans, kwartelkoning, rosse grutto, drieteenstrandloper, grauwe franjepoot, grote jager, groene specht, boomleeuwerik, klapekster.

Nieuwe aanwinsten in deze categorie waren echter;

44	Witoogeend	29/8'63	2 exx. zomerkleed (Hartog)
68	Wilde zwaan	28/3'64	15 exx. (Swaab, Roever)
85	Bruine kiekendief	29/8'64	1 ex. (groep Pahlsson)
184	Dwergstern	29/8'64	+ 30 exx. op + 5 m hoogte • overvliegend en roepend (Hartog)
236	Wielewaal	23/7'64	• ô langs Spaarnwouderdijk in vlier (Hartog)
266	Beflijster	22/23/3'64	• ô (Niessen)
315	Oeverpieper	28/3'64	1 ex. (Swaab, de Roever)

Broedvogels. Nieuwe aanwinsten in deze categorie zijn;

39	Slobeend	2 nesten met resp. 13 en 6 eieren gevonden, later eenmaal 16 jongen gezien.
42	Kuifeend	1 nest met 7 eieren gevonden
43	Tafeleend	2 eieren en 1 half-leegegezogen ei gevonden
105	Porceleynhoen	op grond van vele en langdurige waarnemingen 1, waarschijnlijk 2 paar broedend.

Dodaars en grutto vielen af.

Fouragerend en op doortrek vertoonden zich achter Sloterdijk buiten de als Brv. gequalificeerde soorten; dodaars, blauwe reiger, lepelaar (in grote groepen), wintertaling, zomertaling, krakeend (22/3'64 ô), smient, pijlstaart, (28/3'64 + 150 exx.), grote zaagbek, nonnertje, grauwe gans, (21/3'64 16 exx.), blauwe kiekendief (3/1'64 @), boomvalk (29/8'64 ô) slechtvalk (19/4'64 1 ex.), torenvalk (2 paar broedend in naaste omgeving), bontbekplevier, steenloper (3/5'64 1 ex. 2/8'64 3 ex.), watersnip, poelsnip (21/7'64 1 ex., lange tijd zeer mooi gezien), bokje, houtsnip, wulp, regenwulp, grutto (veel meer dan voorgaande jaren), witgatje, bosruiter, oeverloper, zwarte ruit, groenpootruiter, kleine strandloper, temmincksstrandloper, bonte strandloper, krombekstrandloper (23/7'64 7 exx in prachtkleed), kemphaan (broedvogel, naaste omgeving), grote kleine mantelmeeuw, (britse en skandinavische vorm), zilvermeeuw, stormmeeuw, dwergmeeuw (14 en 15'8'64 1 juv. ex.), zwarte stern, noordse stern, (29'8'64 1 ad. + 1 juv.), holenduif, houtduif, gierzwaluw, strandleeuwerik (21/3'64 + 15 exx.), boerenzwaluw, huiszwaluw, zwarte kraai, kauw, ekster, (laatste drie soorten broeden in naaste omgeving), koolmees, grote lijster kramsvogel, zanglijster, koporwiek, merel, tapuit, paapje, roodborst-tapuit, (2/8'64 1 ex.), roodborst, witte kwikstaart, spreeuw, groenling, kneu, putter (21/3'64 1 ex.), frater, vink, keep, ijsgors (2/1'64 2 exx.), huismus, ringmus.

Buiten de als TG gequalificeerde soorten zijn de voldoende soorten niet gezien; fuut, roodhalsfuut, kuifduiker, geoorde fuut, aalscholver, ooievaar, toppereend, middelste zaagbek, kolgans, rotgans, brandgans, buizerd, sperwer, zilverplevier, goudplevier, koekoek, bonte kraai, roek, pimpelmees, winterkoning, fitis, heggemus, sijs.

In totaal werden in de periode Januari t/m September 1964 107 soorten waargenomen, waarvan 25 als broedvogel en 7 soorten als "nieuw" voor dit gebied.

Samengesteld door; A. Hartog, Admiralengracht 205 hs. Amsterdam-W.

Ah/Ja.