

Sloterplas, September 1963 t/m September 1964.

(vgl. voor overzicht 1962/63, Mededelingenblad KNNV, VWG Asd. 2e jaargang No. 4 1963)

Toevallige gasten

Geen waarnemingen vonden plaats van de in het vorig overzicht als TG gequalificeerde soorten: Ooievaar, grote zee-eend, eidereend, middelste zaagbek, wilde zwaan, velduil.

Nieuwe aanwinsten in deze categorie waren echter:

|     |                        |                |  |
|-----|------------------------|----------------|--|
| 8   | Geoorde fuut           | 6 en 10/9'63   | 1 ex. (A. Hartog)                                      |
| 105 | Porceleynhoen          | 28/4'64        | roepend (Prantl, Andriese)                             |
|     |                        |                | Mededelingenblad KNNV VWG Asd. 2e jrg.<br>No. 3 blz. 6 |
| 206 | Ransuil                | 6/6'64         | 1 ex. jagend bij Oostever<br>(A. Hartog)               |
| 195 | Koekoek (rossige fase) | 10/6'64 (o.a.) | 2 exx. copulerend bij<br>Westever (A. Hartog)          |

Broedvogels Hiervan vielen af:

|     |                 |                       |
|-----|-----------------|-----------------------|
| 115 | Kievit          | (1963: 1 territorium) |
| 310 | Gele Kwikstaart | (1963: 2 territoria)  |
| 335 | Geelgors        | zie noot.             |

Fouragerend vertoonden zich als nieuwe soorten bij de Sloterplas:

|     |            |          |  |
|-----|------------|----------|--|
| 90  | Boomvalk   | 29/8'64  | 1 ex. jagend bij Westever<br>(F. de Jong)                        |
| 242 | Kramsvogel | 23/12'63 | 13 exx. bij Westever<br>(A. Hartog, A. de Jong)                  |
| 250 | Koperwiek  | 23/12'63 | 2 exx. over Sloterplas<br>richting Z. (A. Hartog<br>A. de Jong)  |
| 258 | Koolmees   | 10/8'64  | 1 stervend ex. aan West-<br>ever met zaden in bek<br>(A. Hartog) |
| 319 | Groenling  | 16/9'64  | + 30 exx. bij Westever<br>op harig wilgenroosje<br>(A. Hartog)   |
| 322 | Kneu       | 24/5'64  | 2 exx. bij Westever<br>(A. Hartog, A. de Jong)                   |

Overvliegend zijn als nieuwe soorten waargenomen:

|     |          |          |   |
|-----|----------|----------|---|
| 58  | Kolgans  | 23/12'63 | 26 exx. over Westever<br>richting Z. (A. Hartog,<br>A. de Jong) |
| 60  | Rietgans | 23/12'63 | 23 exx. over Westever<br>richting Z (A. Hartog,<br>A. de Jong)  |
| 129 | Wulp     | 6/6'64   | vele exx. gehoord (A. Hartog)                                   |

In totaal werden in de periode September 1963 t/m September 1964 69 soorten waargenomen, waarvan 19 als broedvogel en 12 soorten "nieuw" voor dit gebied.

Noot: in de periode eind Mei-begin Juni, zijn er verschillende Geelgors waarnemingen gedaan bij de Cornelis Lelylaan door A. Hartog en F. de Jong. Van de Fuut is dit jaar een broedsel geconstateerd, ondanks de enorme drukte. Van de kuifeend is een nest gevonden, doch er moeten minstens 6 broedparen geweest zijn, gezien de grote aantallen nog niet vliegvlugge jongen.

Samengesteld door A. Hartog, Admiralengracht 205 hs., Amsterdam(W).