

vervolg inventarisatie Amsterdamse bos Openluchttheater.

	1964	1965
287 fitis	5	2 ++
288 tjiftjaf	8	3 ++
294 grauwevliegenvanger	0	0
298 heggemus	1	2
312 spreeuw	ng	ng
315 groenling	0	1
329 vink	8	8
340 huismus	0	0

(nummering volgens VG 3e druk)

ng = als broedvogel aanwezig, doch geen territoria geteld.

De inventarisatie geschiedde door leden van "groep Pahlsson".

De gegevens werden uitgewerkt door HH. Wieringa, Sistermans, den Boer, met assistentie van de Hr. J. Reijnders.

Geinventariseerd werd gedurende de periode van 13/3 t/m 12/6, eenmaal per week, in de zeer vroege ochtend.

++ Vermoedelijk voornamelijk tengevolge van Rappen van de onderbegroeing is het aantal territoria van nachtigaal, fitis en tjiftjaf teruggelopen.

H. Sistermans,
Ruysdaelkade 172 I
tel. 730002

Contact-adres groep "Pahlsson"

JA/v. Dr. Juli 1965

VRAGEBRUBRIEK (vragen opgesteld door J.W. de Roever)

1. Wat is het verschil in snavel tussen die van een sijsje en van een Europese kanarie ?
2. In welke maand kunt U Noorse gele kwikstaarten verwachten ?.
3. Noem 5 vogelsoorten, die goed zichtbaar een kuif dragen, en die in Nederland jaarlijks waarneembaar zijn.
4. Noem 2 opvallende verschilpunten tussen een juveniel grote bonte specht en een volwassen middelstembonte specht.
5. Wat is het verschil in pootkleur tussen kleine en Temmincksstrandloper.