

Broedvogelinventarisatie van 2 gebieden met jonge aanplant, elk ongeveer 5 ha. groot, in de omgeving van het kampeerterrein in het Amsterdamse Bos (gedeelte van "Schinkelpolder")

Bij het bestuderen van vroegere broedvogelinventarisatie-gegevens van het Amsterdamse Bos, was ik nogal verbaasd over de grote bevolkingsdichtheid, die sommige broedvogels bereikten in 6 - 9 jarige aanplantingen. Dit betrof vooral de soorten als Spotvogel, Tuinfluiter en Fitis, waarvan vroeger soms 22 tot 25 territoria per 10Ha werden vastgesteld.

Om na te gaan, of in het huidige Amsterdamse Bos deze bevolkingsdichtheid nog voorkwam, werd in de afgelopen winter gespeurd naar jonge aanplant met een oppervlakte van + 10 Ha. Een aangesloten stuk van deze grootte bleek niet meer te bestaan, maar in de Zuidpunt van het Bos vond ik twee gedeelten, die elk ongeveer 5 Ha. groot waren.

Eén gedeelte bestond uit een strook 6-jarige aanplant langs de kleine Noorddijk tussen de Bosrandweg en de Oeverlanden van de Amstelveense Poel. Het andere gedeelte lag ten N.O. van het kampeerterrein en werd omzoomd door de waterpartijen met de bruggen nummer 572, 576 en 577. Deze aanplant bleek 5 jaar oud te zijn.

Uiteraard is het beter om een aaneengesloten gedeelte van 10 Ha. te inventariseren, maar in dit geval was deze mogelijkheid niet meer aanwezig. Achteraf zou blijken, dat de vogelbevolking van beide gedeelten enkele opvallende verschillen vertoonde, zodat de inventarisatie van twee afzonderlijke gedeelten juist interessante gegevens opleverde. Het resultaat van de inventarisatie dient dan ook voor elk gedeelte apart bezien te worden; het aantal territoria is dus voor beide gebieden afzonderlijk weergegeven in onderstaande tabel.

	<u>I. Kleine Noorddijk</u>		<u>II Andere gedeelte</u>	
Bosrietzanger	10		0	} alleen aanwezig in gebied I
Spotvogel	2		0	
Rietzanger	2		0	
Tuinfluiter	12		5	} in gebied I veel talrijker dan in II
Merel	5		1	
Zanglijster	4		1	
Fitis	7		6	} klein verschil tussen beide gebieden.
Grasmus	6		5	
Heggemus	2		1	
Kneu	2		1	
	-		-	
Totaal	52		20	

Opmerkelijk is het verschil in vogelrijkdom tussen beide gebieden, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door de Bosrietzanger en de Tuinfluiter. Het Leeftijdsverschil van één jaar is hiervan nauwelijks de oorzaak. Het grote verschil is wel, dat de bos-aanplant langs de Kleine Noorddijk niet geschoffeld werd, terwijl in het andere gedeelte wel de schop werd gehanteerd. Het eerstgenoemde stuk was ondoordringbaar vanwege de brandnetels; bovendien was de oever van de aangrenzende kanobaan getooid met een dichte vegetatie van harig Wilgenroosje. Beide planten schieden een gunstig biotoop voor de Bosrietzanger. Ook van de tuinfluiter is bekend, dat deze een dichte ondergroei met brandnetels prefereert.

Opvallend is het gering aantal broedvogelsoorten. Winterkoning, Tjiftjaf en Houtduif waren nog niet aanwezig in de zesjarige aanplant, maar zullen stellig binnen enkele jaren als broedvogel hier verschijnen.

Zoals uit de tabel blijkt, voldeed alleen de Tuinfluiter in gebied I aan de verwachtingen, met een bevolkingsdichtheid van 12 territoria per 5 Ha., dus vergelijkbaar met 24 territoria per 10 Ha.

De Fitis kwam in dit gebied tot 7 territoria per 5 Ha., terwijl de Spotvogel met 2 territoria per 5 Ha wel wat teleurstelde. Opmerkelijk is de Bosrietzanger, die met 10 territoria per 5 Ha. voor het Amsterdamse Bos een ongekende dichtheid bereikte.

De inventarisatie vond plaats tussen 11 april en 20 juni 1965.

Er werden 17 zeer vroege ochtendexcursies en 1 avondexcursie gehouden, elk met een gemiddelde tijdsduur van $2\frac{1}{2}$ uur.

Veel hulp werd ondervonden van de Hr.H. Bresser, die liefst 11 excursies voor zijn rekening nam. Het uitwerken van de gegevens vond plaats met behulp van de HH. J.J.Frieswijk en H. Bresser.

J. R e i j n d e r s

adres samensteller;
Nieuwe Meerdijk 382, Badhoevedorp.
tel.02968/4268

SPL/JRe/v.Dr./JA.
13-7-1965.