

Overzicht waarnemingen SLOTERDIJK en SLOTERPLAS Sept. 1964 t/m Sept. '65

vgl. voor vorige overzichten;

Sloterdijk 1962/1963 Mededelingenblad KNNV VWG Asd 2e jrg (1964), Nr.1, blz.18-22
 Jan. t/m Sept. 1964; 3e jrg. (1965), nr.1, blz.18.
Sloterplas 1962/1963; 1e jrg. (1963), nr.4, blz.25-26
 Sept.'63 t/m Sept.'64: 3e jrg. (1965), nr.1, blz.19

SLOTERDIJK:a. Toevallige gasten:

Geen waarnemingen vonden plaats van de in de eerste overzichten als TG gequalificeerde soorten: parelduiker, witoogend, krooneend, grote zeeëend, rotgans, wilde zwaan, kwartelkoning, houtsnip, drieteenstrandloper, dwergstern, grote jager, groene specht, wielewaal, boomleeuwerik, beflijster, oeverpieper, klapekster, putter. Nieuwe aanwinsten in deze categorie waren echter;

zwarte zee-eend	5/3/1965	ô in Westhaven (Keizer/Odink)
visarend	15/9/1965	1 ex vissend in Westhaven (de Roever)
smelleken	7/11'64	1. ex (De Roever)
kanoetstrandloper	3/4/1965	3 exx in overgangskleed (Hartog, A, de Jong, Versluys)
steltkluut	12/5-21/5/1965	2 exx door diverse VWG-leden gezien waarschijnlijk van de broedgevallen in de Zaanstreek? geluidsopnamen gemaakt door Hr.Simons.
	22/5/1965	4 exx (Hartog)
grote burgemeester	28/2 en 4/3/1965	1 juv. bij N.DSM (Odink; Hartog)
tortelduif	13/7/1965	6 exx bij N.DSM (med. Hr. Fr eswijk)
vlaamse gaai	3/5/1964	1 ex Spaarnwouderdijk (dito)
bosrietzanger	20/6/1965	zingend ex Hornweg (dito)
grasmus	6/8/1965	dood ex bij spaarnwouderdijk (dito)

b. Broedvogels;

nieuwe aanwinsten in deze categorie zijn:
 dodaars, fazant, waterral, velduil.

Toelichting;

dodaars door uitbreiding Sloterdijk is ook het inventarisatieterrein uitgebreid; in "meertjes" bij Westhaven broedden in 1964 6 paar. in 1965 3 paar (Frieswijk, Hartog)

slobeend 4 nesten gevonden; waarschijnlijk echter ± 35 broedparen (Hartog)

kuifeend 29/5/1965 1 nest met 2 eieren (Hartog)

tafelend 29/5/1965 1 nest met 6 eieren (Hartog)

bergeend 13/5/1965 1 nest met 8 eieren (Hartog)

kwartel t.g.v. sterke terreinveranderingen als "broedvogel naaste omgeving" in aantal sterk achteruit, n.l. in 1963 ± 12, in 1964 ± 6, in 1965 2 broedparen.

fazant broeden aangenomen op grond van langdurige waarnemingen en vliegvlugge jongen.

waterral vele waarnemingen in broedperiode; op 17/8/1965 oud nest gevonden (Hartog)

porseleinhoen 20/5/1965 1 nest met 10 eieren (Hartog)

velduil vanaf 2/4/1965, 1 ex (Versluys) t/m 13/6/1965 2 ad. + 3 juv (Hartog)

c. Fouragerend en op doortrek vertoonden zich wederom achter Sloterdijk- buiten de reeds als "broedvogel" genoemde soorten;- : fuut (2/1'65 1 ex.), kuifduiker (6/2'65 1 ex.), purperreiger (17/8/65 2 juv), blauwe reiger, lepelaar (soms in groten getale), winter taling, zomertaling (21/10'64 ô), krakeend (3/8'64 2 exx.), smient, pijlstaart, grote zaagbek, nonnetje, brandgans (24/12'64 + 100 exx overvliegend), bruine kiekendief (29/8'64-20/9'64, 5/5/'65-22/5/'65, en vanaf 14/8/'65 steeds 1 ♀), boomvalk (14/8'65 ♀), slechtvalk (31/10'64-28/3'65 juv.ex.), torenvalk (2 paar broedend naaste omgeving), bontbekplevier (17/5'65 + 60 exx), goudplevier (18/5'65 2 exx.), zilverplevier (2/5'65-18/5'65 2 exx), steenloper (25/4'65-9/5'65 3 exx), watersnip, bokje,

(Sloterdijk vervolg)

wulp, regenwulp, grutto (t.o.v.1964 iets afgenomen), rosse grutto (24/4'65- 30/4'65 2 exx.), witgatje, bosruiter, oeverloper, zwarte ruiter, groenpootruiter, kleine en temminck'sstrandloper, bonte strandloper, krombekstrandloper (4/8'65 6 exx) kempiaan, grauwe franjepoot (30/8'65), grote en kleine mantelmeeuw (graelsii en intermedius), zilvermeeuw, stormmeeuw, dwergmeeuw (30/7'65 - 3/3'65, 1 juv.ex.) noordse stern (15/9'65 1 dood ex.), zwarte stern (30/8'65 6 exx.), holenduif, houtduif, steenduil (niet meer als broedvogel), gierzwaluw, strandleeuwerik (geregeld + 20 exx van 31/10'64 tot in April 1965), bonte kraai (2/1'65, 5exx.), boerenzwaluw, huiszwaluw, zwarte kraai, kauw, ekster, koolmees (laatste 6 soorten broedvogels naaste omgeving), grote lijster, kramsvogel, zanglijster, koperwiek, merel, tapuit, roodborst, heggemus, witte kwikstaart, spraeuw, groenling, kneu, frater (vanaf October '64 tot Maart '65 steeds + 60 exx.) huismus en ringmus.

Buiten de boven reeds als TG gequalificeerde soorten zijn de volgende soorten niet gezien;

roodhalsfuut, geoorde fuut, aalscholver, ooievaar, toppereend, brilduiker, middelste zaagbeek, grauwe gans, kolgans, rotgans, buizerd, sperwer, poelsnip, koekoek, roek, pimpelmees, winterkoning, roodborsttapuit, paapje, fitis, sijs, ijsgors.

In totaal werden in de periode September 1964 t/m september 1965 108 soorten waargenomen, waarvan 29 als broedvogel en 10 soorten als "nieuw" voor dit gebied.

Vanaf December 1961 t/m september 1965 zijn er in totaal 149 soorten waargenomen.

SLOTTERPLAS (Sept.1964 t/m Sept.1965)

Geen waarnemingen vonden plaats van de volgende in vorige overzichten gepubliceerde soorten; ooievaar, geoorde fuut, brilduiker, grote zee-eend, eidereend, middelste zaagbek, grauwe gans, kolgans, rietgans, wilde zwaan, boomvalk, porceleinhoen, goudplevier, wulp, zwarte stern, velduil, geelgors.

a	Nieuwe aanwinsten voor de Slotterplas waren echter;		
	roodhalsfuut	9,10/1'65	1 ex bij eilandjes (Hartog/Oreel)
	zwarte zee-eend	6/3'65	ad ♀ (F.de Jong)
	purperreiger	13/5'65	1 ex overvliegend (Hartog)
	wintertaling	2/1'65	♂ bij eilandjes (Hartog)
	rotgans	20/2'65	's avonds + 5 min. lang roep gehoord (Hartog)
	buizerd	febr.1965	steeds 2 exx slapend bij zwembad (Hartog, Minderhoud)
	waterral	17/4'65	's avonds 1 ex roepend (Hartog)
	bonte kraai	2/1'65	1 ex overvliegend (Hartog)

b broedvogels:

Nieuwe aanwinsten in deze categorie zijn;

koolmees, groenling, kneu.

De fuut viel af als broedvogel, als gevolg van het toenemend aantal watersportliefhebbers, terwijl de kuifeend slechts met 5 paar tot broeden kwam.

Het aantal broedvogelsoorten bedraagt 20 (inclusief de koekoek)

c	Buiten de sub a) genoemde soorten (Toevallige gasten) en de broedvogels zijn de volgende soorten waargenomen;
	fuut, dodaars, aalscholver en blauwe reiger (deze beide soorten fouragerend), lepelaar (8/5'65 1 ex overvliegend), smient, pijlstaart, slóbeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje (2/1'65 ♀), bergeend (27/3'65 1 ex), torenvalk, scholekster, Kievit grutto, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, kokmeeuw, visdiefje, houtduif, koekoek (beide fasen), ransuil (broedvogel naaste omgeving), gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, zwarte kraai, kauw, pimpelmees, roodborst, witte en gele kwikstaart, spreeuw, vink, huismus.

In totaal werden in de periode September 1964 t/m September 1965 63 soorten waargenomen, waarvan 19 als broedvogel en 8 soorten als "nieuw" voor dit gebied.

vanaf Januari 1962 t/m September 1965 zijn er in totaal 81 soorten waargenomen.

(Sloterplas-vervolg)

NB correctie:

Mededelingenblad 3e jaargang (1965) No.1, blz.19;

"rossige fase koekoek- 2 exx copulerend" moet zijn;"2 x 1 ex copulerend."

NOOT:

Ik ben mij er volkomen van bewust dat ik, wat betreft de overzichten, steeds achterloop. Als voorbeelden noem ik de gaai van Sloterdijk. of de 3 kanoetstrandlopers van Sloterdijk, de ♂ wintertaling van Sloterplas.

Ik kan mij n.l.niet voorstellen dat beide soorten in die gebieden niet reeds eerder in zijn waargenomen.

Het is onmogelijk voor mij alleen om de steeds zich uitbreidende of veranderende gebieden exact bij te houden.

Daarom doe ik graag op de lezers een beroep om mij in kennis te stellen van noodzakelijke correcties c.q. aanvullingen op het tot nu toe over deze gebieden gepubliceerde.

Samensteller: Ad Hartog, Admiralengracht 205 hs, Amsterdam.

AH/vdr./JA

October 1965