

Wespendief


- 1 houdt vleugels tijdens glijvlucht om de ca.8 à 10 vleugelslagen gestrekt. Wespendief geeft in het algemeen de indruk meer haast te hebben.
- 2 Silhouet slanker. Kop steekt naar buiten; kop is klein. Vaak licht oog.
- 3 de hoeken van het staarteinde zijn ronder.
- 4 heeft 2 strepen op de staart bij de staartwortel; 1 streep bij het staarteinde (vaak niet duidelijk te zien).
- 5 heeft knik bij pols en tussen pols en lichaam.(in glijvlucht)
- 6 heeft donkere streep op uiteinde kleine slagpennen.

T.A.V.de Ruigpootbuizerd kan het volgende worden opgemerkt;


- 1 houdt vleugels meer omhoog bij glijvlucht, om de 2 à 3 slagen.
  - 2 vleugelvorm lijkt op die van buizerd.
  - 3 brede staartband scherp gemarkeerd van wit op bovenstaart.
  - 4 heeft op onderstaart brede band (lichte buizerd nauwelijks).
  - 5 heeft grotere zwarte polsvlekken dan lichte buizerd;
- lichte buizerd heeft niet zo'n donker borstschild als ruigpootbuizerd, maar dat heeft de juv.ruigpoot ook niet.

NB; over het algemeen is voor de onderscheiding der soorten de vleugelvorm veel belangrijker dan de getalwaarden gegeven sub 1.

- Mede i.v.m.de enorme variëteiten in vederkleed, blijven er toch nog een aantal exemplaren, die zeer moeilijk te dtermineren zijn. Zo zagen wij een zeer lichte, bijna witte, wespendief, een prachtig exemplaar.
- Bij sommige vogels meenden wij een juveniele dwergarend te zien, doch zekerheid konden wij niet verkrijgen.



WESPENDEEF



BUIZERD

In totaal hebben wij 3753 roofvogels geteld; wij schatten dat wij er ongeveer 4000 gezien hebben en dat er tijdens ons verblijf ca.5500 gepasseerd zijn; dit is voor Falsterbo vrij weinig....!

Voor het gedrag van de trekvogels verwijzen wij naar Rudebeck "Studies on Bird-migration 1950".

Heel leuk was het om het verschil op te merken in reactie van de vogels boven de watervlakte. Tijdens fraai trekweer zagen wij een groep van 20 eksters zee kiezen en terugkeren en een paar Vlaamse gaaien aarzelen.

De roofvogels trekken over het smalste gedeelte van het schiereiland en blijven daar eerst een tijd rondzweven, gebruik makend van de thermiek. Er is daar n.l. een grote heidevlakte, waar wij rond 10 uur het begin van de trek konden waarnemen, na eerst 's-ochtends vroege de trek van de zangvogels bekeken te hebben op de zuidwestpunt.

Op het schiereilandje zagen wij verder o.a.; roodkeelduiker of parelduiker (ver op zee); ijseend, middelste zaagbek, grauwe ganzen, kleine plevier (schaars voor Zweden); poelsnip (in het tijdschrift van de Zweedse Ornithologische Vereniging Vår Fågelvård - 24, afl.2 - staat een fotoreportage van de balts van de poelsnip!); kleine jager, reuzenstern, bosuilen, kortsnavelboomkruiper, kruisbekken.

Wij hebben foto's kunnen nemen o.a. van geringde noordse nachtegaal, draaihals, koekoek, grauwe klauwier, krombekstrandloper, ortolaan.

Twee keer hadden wij het geluk een lift te krijgen van een Engelse ornitholoog naar een paar meertjes in het binnenland (ongeveer 40 km van Falsterbo).

Op een punt, waar wij een goed uitzicht hadden op het meer zagen wij; 2 buizerden, 2 wespddieven, enige sperwers, 2 rode en 2 zwarte wouwen, 2 bruine kiekendieven, 1 visarend, 1 boomvalk en een groep van 35 kraanvogels, luid roepend overvliegend, tegen de achtergrond van het wijde Zweedse land- een onvergetelijke ervaring.

In totaal hebben wij daar ongeveer 100 kraanvogels en 5 visarenden gezien, hetgeen het belang van deze plek nog eens onderstrept.

Het is dan ook te begrijpen, dat vele ornithologen een paar dagen in Falsterbo doorbrengen. Er waren zelfs een paar jongens uit Liverpool, en wij hebben er ook nog andere Nederlanders ontmoet.

Iedereen, die het magnifieke gezicht van groepen overtrekkende wespddieven wil meemaken, raden wij Falsterbo ten zeerste aan.

Samensteller;:

Ed Veling,  
van Breestraat 72,  
Amsterdam.  
Telf.793.517

November 1965

EV/vDr/J.A.