

OV DE CHT SLOTERDIJK van Sept. 1965 t/m Sept. 1966.

(vgl. voor overige overzichten Sloterdijk;

1962/1963

Mededelingenblad IJNV. V.G.Asd.

2e jrg. '64 No.1 blz.8-12

Jan. t/m sept. '64

3e jrg. '65 No.1 blz.18

Sept. '64 t/m sept. '65

IJNV, V.G.Asd.

3e jrg. '65 No.4 blz.7-8

IJNV, V.G.Asd.

Toevallige gasten:

Er vonden geen waarnemingen plaats van de onderstaande 33 inmiddels als T.G. gequalificeerde soorten.;

kuifduiker, roodhalsfuut, parelduiker, ooievaar, wilde zwaan, brandgans, rotgans, kolgans, witoogend, toppereend, krooneend, grote zeeëend/-middelste zaagbek, visarend, sperver, smelleken, tortelduif, poelsnip, houtsnip, grote jager, grote burgemeester, drieteenmeeuw, dwergstern, groene specht, boomleeuwerik, wielewaal, beflijster, bosrietzanger, grasnus, oeverpieper, klapekster en ijsgors.

/- zwarte zeeëend  
Nieuwe aanwinsten in deze categorie waren echter;

Kleine zilverreiger	29-7 tot minstens 7-9'66	veel in gezelschap van blauwe reigers ( Martog, Vera; later door vele anderen) ( zie med.bl.No.3 blz.19)
Flamingo	12-3 tot 13-4'66	misschien hetzelfde expl. uit de Ringvaart.
Roelruiter	28-7 tot 29-8-'66	veelal solitair (v. IJzendoorn, Frieswijk; later door vele anderen) (zie med.bl.3, blz. 20)
Breedbekstrandloper	22-5-'66	1 ex. ( de Roever) ( zie med.bl.3, blz.21)
Reuzenstern	29-7-'66	1 ex. tussen meeuwen (Frieswijk, v. IJzendoorn)
Beardmannetje	winter '65/'66	19 exx.geringd (Valters; zie med.bl.No.2, blz.2)
Blauwborst ( meest witgesterde)	vanaf 28-8 tot in oktober 1966	meestal jonge exx.echter ook adulte gezien; eenmaal minstens 6 exx.bijeen, waarvan 1 roodgesterd)

De volgende als TG gequalificeerde soorten werden opnieuw waargenomen;

Geoorde fuut	juni/juli'66	steeds 2 exx.op ondergelopen veiland.
Kwartelkoning	24-7-'66	roepend ex. in zulteveld (Tilburg)
Grauwe franjepoot	juli-begin Sept'66	meerdere exx.aanwezig
Stelthluut	20-5-'66	nest met 2 eieren; verloren gegaan door opsputtingen; er zijn 3 exx.aanwezig geweest.

Broedvogels

Dit jaar zijn 32 broedvogelsoorten vastgesteld. Er is in vergelijking met 1965 van de volgende soorten geen broeden vastgesteld; tafeleend, kwartel en velduil.

Nieuwe aanwinsten in deze categorie zijn echter; stelthluut en zwarte stern.

Door uitbreiding van het gebied verderom na enkele jaren broedend aangetroffen; fuut, knobbelzwaan en tureluur.

Noot broedvogels; fuut	in 1966 3 broedparen op ondergelopen weilanden.
knobbelzwaan	in 1966 1 broedpaar op ondergelopen weilanden.
zwarte stern	op 6-6-'66 nest met 2 eieren gevonden op ondergelopen weilanden. ( O.V.)

Apart zou ik willen vermelden 12 broedvogelsoorten van de naaste omgeving ( onder n.o. wordt verstaan; een strook van 100 m. breed rondom het gehele gebied ) , waarvan mag worden verwacht dat zij in het onderzoekgebied kunnen worden waargenomen. Deze soorten zijn; torenvalk, houtduif, kerkuil, ransuil, zwarte kraai, kauw, akster, spreeuw, winterkoning, pimpelmees, roodborst, fitis en huisms.

De 32 broedvogelsoorten van 1966 zijn; fuut, knobbelzwaan, wilde eend, slobbeend, wintertaling, kuifeend, bergeend, water-ral, porscleinhoen, waterhoen, meerkoet, kleine plevier, strandplevier, Kievit, kluit, scholekster, steltkluit, tureluur, kokmeeuw, visdiefje, zwarte stern, patrijs, fazant, veldleeuwerik, kuifleeuwerik, oeverzwaluw, kleine karekiet, rietzanger, graspieper, gele kwikstaart, witte kwikstaart en rietgors.

Fouragerend en op doortrek vertoonden zich wederom in het gebied "Sloterdijk" buiten de als TG en als broedvogels gequalificeerde soorten; Dodaars ( tot 30 exx op 15/10'1966 O.V.), roerdomp ( 1 ex.october), blauwe reiger, purperreiger ( 1 ex.September), lepelaar ( in Augustus tot 160 exx.) grauwe gans ( 29/7'66 2 exx.), pijlstaart ( tot 40 exx. in maart O.V.), krakeend ( 20/6'66 mannetje en vrouwtje O.V.), smient ( tot 3500 exx.O.V.), zomertaling ( tot 100 exx O.V.), brilduiker ( 28/2'66 vrouwtje O.V.), tafeleend ( tot 250 exx.O.V.) grote zaagbek, nonnetje ( 15/1'66 mannetje en vrouwtje Westhaven), buizerd, ( 22/5'66 1 ex.), bruine kiekendief ( aug. en sept.), blauwe kiekendief ( winter '65/66) slechtvalk ( 8/5'66 1 ex.), boomvalk, holendief, bontbekplevier ( tot 500 exx.) zilverplevier, goudplevier, steenloper ( 7x), bonte strandloper, krombekstrandloper, grutto ( meer dan in '65, doch minder dan in '64), rosse grutto ( 2x), wulp, regenwulp, watersnip, bokje, witgatje ( tot ongeveer 60 exx.), bosruiter, kempaan, groenpootruiter, zwarte ruiter, oeverloper, drieteenstrandloper, ( 23/10 '65 4 exx.), kanoetstrandloper ( 22/5'66 30 exx.), kleine strandloper, temmincks strandloper, ( 22/5'66 35 exx.), grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, dvergmeeuw ( 29/5 - 2/6'66 1 ex.), kwartel ( alleen 8/5 gehoord, geen brv. meer) steenuil ( ook geen broedvogel meer), velduil ( in winter 1965'66 enkele exx.), bonte kraai, koekoek, strandleeuwerik ( winter '65/66 tot 25 exx), gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, gaai, koolmees, merel, kramsvogel, zanglijster, koperwiek, tapuit ( tot 5 exx.), paapje ( tot 3 exx.), kneu, frater ( winter '65/66 tot 60 exx.), vink, keep, ( winter '65/66 tot 30 exx.) ( tegelijk waargenomen) putter ( nov.dec.'65), groenling, ringmus, heggemus en sneeuwgorst ( winter '65/66 tot 75 exx.).

Niet waargenomen van deze categorie zijn; noordse stern, roek, grote lijster en roodborsttapuit.

In totaal werden in de periode september 1965 t/m september 1966 127 soorten waargenomen, tegen 108 soorten in voorgaand jaar. De tamelijk sterke stijging van soorten is mede te danken aan de uitbreiding van het waarnemingsgebied, dat nu als grenzen heeft;

spoorlijn Amsterdam-Halfweg, Spaarnwouderdijk tot nieuwe haven, Noordzeekanaal tot Fordhaven en in rechte lijn naar station Sloterdijk.

In totaal zijn daar nu sinds december 1961 165 soorten waargenomen.

Samensteller A.Hartog  
Admiralengracht 205 hs.  
Amsterdam-I.