

U I L E N V E R S L A G

Na een algemeen uilenonderzoek in het Amsterdamse Bos van 1961 tot 1966, zijn ondergetekenden er toe overgegaan om hun bevindingen op schrift te stellen. Daartoe laten wij een verslag van 25 à 30 bladzijden verschijnen, waarin wij een zo volledig mogelijk beeld van onze werkzaamheden trachten te geven. Hieronder volgt een kort overzicht van de inhoud van dit verslag.

In februari 1963 begonnen wij met het verzamelen van braakballen van de Ransuil en het inventariseren van het Amsterdamse Bos (in het verslag vindt men van beide onderzoeken uitgebreide tabellen en gegevens). Eind 1964 stopten wij met het braakballen verzamelen en legden wij ons geheel toe op een nadere bestudering van de levenswijze van de Ransuil. De braakballen werden in deze jaren op 20 verschillende winterroestplaatsen verzameld. Wij vonden in totaal op 52 verschillende plaatsen nesten, waarvan 32,6 % in de loop der jaren meer dan eenmaal als broedplaats gebruikt werd. Gemiddeld vonden wij 16 broedterritoria per jaar. Bij de bestudering van de nesten en van de winterroestplaatsen vielen bepaalde overeenkomsten op. De winterroestplaatsen bijv. waren of gevestigd in jonge, dichte loofbossen, of in bepaalde naaldboomcomplexen.

Van de oecologie van de Ransuil hebben wij de levenscyclus van nestjong tot adult exemplaar, het uitvliegen, het prooigrijpen en het herkenningsvermogen meer of minder diepgaand bestudeerd. Hierdoor hebben wij vele "vreemde" waarnemingen gedaan. Voorts zijn er jongen geringd en eieren gemeten. Om het overzicht zo volledig mogelijk te maken, hebben wij een uitvoerige beschrijving van Uilen in het algemeen en van de Ransuil in het bijzonder opgesteld door zeer veel literatuurgegevens te combineren. Wij hebben vele honderden braakballen gemeten, gewogen en uitgeplozen. Als prooidieren hebben wij vogels, insecten, slakken en 10 soorten zoogdieren gevonden. De determinaties stonden onder controle van de Heer van Laar, zoogdier-specialist; uitgebreide tabellen geven een duidelijk beeld van aantal en soort prooidieren per maand per plaats. De gegevens hiervan zijn vergeleken met publicaties van reeds verrichte onderzoeken in het Bos. Omdat de zoogdiersoorten minder bekend zijn, is er voor de volledigheid nog een lijst van kenmerken voor elke soort bijgevoegd. In de braakballen werden naast de gebruikelijke prooiresten 3 slakkenhuisjes en 6 vogelringen gevonden. De gegevens van deze vogelringen staan alle vermeld in het verslag; 2 ervan bijv. waren afkomstig van clandestiene ringers. Een andere bijzondere vondst was die van een "braakbalmuis". Door het braakbalonderzoek is in 1963 de aanwezigheid van een vos in het Amsterdamse Bos vastgesteld.

Vanwege de voor ons hoge kosten, die verbonden zijn aan het uitgeven van dit verslag, zien wij ons genoodzaakt om de prijs op f 2.- per exemplaar te stellen.

Belangstellenden kunnen in het bezit van dit verslag komen door storting van f 2.- op rekening V 13494 t.n.v. F. Versluys, met als vermelding "Verslag".

F. Versluys,
Geuzenstraat 37^{II},
Amsterdam.
Tf. 186330

A. Hartog,
Admiralengracht 205hs, Amsterdam.

A.H./vDr, december 1966