

OVERZICHT SLOTERDIJK, van 1 oktober 1966 t/m december 1967Val. voor vorige overzichten:

	nr:	blz:
1962/1963	Med.bl. KNNV VWG Asd 2e jrg. '64, 1,	8-12
jan. t/m sept. 1964	" " " " 3e jrg. '65, 1,	18
sept. '64 t/m sept. '65	" " " " 3e jrg. '65, 4,	7-8
sept. '65 t/m sept. '66	" " " " 4e jrg. '66, 4,	4-5

In de periode van 1 oktober 1966 t/m 31 december 1967 zijn de opspuitvelden achter Sloterdijk nogmaals uitgebreid en is veel terrein bouwrijp gemaakt, terwijl veel wegen aangelegd zijn; het gebied is dus sterk aan verandering onderhevig. Ook vanwege het enorme oppervlak (+ 1600 ha) is het niet mogelijk, dat één waarnemer een tamelijk compleet beeld van de vogelbevolking krijgt.

Vandaar dat ik voor het eerst sinds het publiceren van deze overzichten vele waarnemers heb verzocht mij hun waarnemingen te zenden. Daarnaast heb ik, zoals gewoonlijk, de rubriek "Waarnemingen van Groot Amsterdam" uit het Mededelingenblad van KNNV VWG Amsterdam geraadpleegd. (Voorzover in het volgende aangehaald, afgekort tot "Med.bl.!).

Mijn hartelijke dank aan de volgende waarnemers, die mij door het zenden van waarnemingen behulpzaam zijn geweest, n.l. de Heren Blekendaal (Bl), Buurma (Bu), Dooremans (Do), Frieswijk (Fr), Odink (Od), Opdam (Op), Oreel (Or), de Roever (dR), Swart (Sw), Veling (Ve), Walters (Wa).

Waar noodzakelijk geacht, werd de afkorting van de naam van de waarnemer(s) achter de waarneming geplaatst. (Aut. = Hartog). Vanzelfsprekend blijven alle waarnemingen ten volle voor de verantwoordelijkheid van de waarnemer(s).

Toevallige Gasten ("TG")

Opnieuw werden de volgende 16 als "TG" gequalificeerde soorten waargenomen:

Geoorde fuut	6/5/'67 2 exx op ondergelopen weilanden (aut. + exc. VVG 't Gooi).
Rotgans	8/4/'67 1 ex zittend, echter gezonde indruk (Wa)
Roodhalsfuut	19/11/'67 1 ex op Nieuwe Haven ts futen (Aut.)
Middelste zaagbek	2/12/'67 ♂ in Nieuwe Haven (Aut.)
Visarend	6/5/'67 1 ex overvliegend (Op)
Sperwer	2/10/'66 1 ex overvliegend met spreeuwenbal (Aut.)
Poelsnip	27/8/'67 2 exx zittend ts vele watersnippen (Do)
Steltkluut	eind mei/begin juni '67 1 ex afwisselend fouragerend op Sloterdijk (Fr, Aut.) en in Zandput Vijfhuizen (Bl, Bu) op ongeveer 4 km afstand.
Grauwe franjepoot	juli '67 verschillende malen 1 ex, eenmaal in prachtkleed
Dwergstern	30/7/'67 2 exx op slaapvlucht (Do)
Tortelduif	mei/juli '67 af en toe een enkel ex.
Boomleeuwerik	10/9/'66 1 ex zittend (med. Sw; de Kruyf, Meyer, Breidenbach)
Baardmannetje	winter '66/'67 + 25 exx; 21 exx gevangen op 12/11/'66 (Med.bl 5e jrg, nr. 1, blz. 5); tot 19/2/'67 2 exx (Wa). Winter '67/'68 van 30/9 af 2 exx (Fr); 26/12/'67 12 exx gevangen (Wa)-
Blauwborst	13-25/9/'67 minstens 1 ex aanwezig (Fr, Aut.)

(Sloterdijk, 2e blz.)

Oeverpieper 5/11/'66 1 ex (Sw); 27/11/'66 2 exx (dR),
25/3/'67 1 ex (Sw), 19/11/'67 2 exx (Aut.)
10/12/'67 1 ex (Aut.), 24/12/'67 1 ex (Wa).
Klapekster 26/12/'67 1 ex ganwezig (Fr).

De volgende soorten zijn nieuwe aanwinsten in de categorie "TG". (12)

Aalscholver 16/9/'67 1 ex overvliegend (Fr)
IJseend 12-20/11/'66 1 ex in o-kleed op ondergelopen
weilanden (Dr, Fr en Bresser)
Eidereend 10/12/'67 + 110 exx + 4 ad. ♂♂ + 10 juv. ♂♂
overvliegend (Aut. + H. en GJ. van Bladeren)
Kleine zwaan 10/12/'67 3 exx overvliegend (idem)
Kl.burgemeester 1/5/'67 1 ex (dR, Ve) (Med.bl. 5e jrg., nr.2,blz.18)
Lachstern 20/5/'67 1 ex tussen andere sterns (Od)
Draaihals 13/9/'67 1 ex in berm Spaarnwouderdijk (Fr)
Buidelmees 28/12/'67 - 1/1/'68 1 ex in ruig en drassig riet-
veld (eerste waarnemers Niesen en van Spanje, daarna velen)
Grote pieper 30/9/'67 1 ex (Fr, Bresser) (Med.bl. 5e jrg.
no. 3/4, blz. 30).
Gr.gele kwikst. 3/9/'67 1 ex tussen vele gele kwikken (Do)
Barmsijs 5/1/'67 + 10 exx (Or, dR, Ve)
Grauwe gors vanaf 24/12/'67 steeds 1 ex langs Hornweg (eerst
de Roever, Oreel, daarna velen)

Enkele opmerkingen omtrent de categorie "TG":

1. De bosrietzanger veranderde reeds in 1966 van TG tot regelmatig waargenomen; in 1967 was deze soort broedvogel.
2. De kwartel veranderde van broedvogel in '62-'65 tot TG in '67.
3. De steltkluut veranderde van broedvogel in '66 tot TG in '67.
4. Dwergstern, 19/6/'66 1 ex (Wa); was nog niet gepubliceerd.
5. Engelse gele kwikstaart, 1 ex 10/9/'66 (med. Sw; de Kruyf, Meyer, Dito 1 ex 26/8/'67 (Aut.) Breidenbach)

Noordse gele kwikstaart, 1 ex 22/4/'67 (Fr, Bresser) 29
Er werden geén waarnemingen gedaan van de onderstaande/inmiddels als TG gequalificeerde soorten:

Kuifduiker, parelduiker, ooievaar, kleine zilverreiger, flamingo, wilde zwaan, brandgans, kolgans, witoogeend, toppereend, krooneend, grote zeeëend, zwarte zeeëend, smelleken, kwartel, kwartelkoning, breedbekstrandloper, poelruiter, houtsnip, grote jager, grote burgemeester, dwergmeeuw, drieteenmeeuw, reuzenstern, groene specht, wielewaal, beflijster, grasmus, ijsgors.

Broedvogels: De 31 soorten van 1967 waren:

Fuut (2 paar), wilde eend, wintertaling, slobeend, kuifeend, berg-eend (max. 200 exx aanwezig; 24/6/67 114 exx + 4 paar en 26 pulli), knobbelzwaan, patrijs, fazant, waterral, waterhoen, meerkoet, schol-ekster, Kievit, kleine plevier, strandplevier, watersnip, grutto, kluut, tureluur, visdief, veldleeuwerik, kuifleeuwerik, oeverzwaluw (kolonie van 15 paar), kleine karekiet, bosrietzanger, rietzanger, graspieper, gele kwikstaart, witte kwikstaart, rietgors.

T.o.v. 1966 waren aanwinsten:

watersnip - mei en juni '67 vele malen baltsend (velen)
grutto - ca. 6 broedparen op vochtige zeeaster-velden (velen)
bosrietzanger - minstens 2 broedplaatsen in ruige delen (velen)

T.o.v. 1966 werd geen broeden vastgesteld van:

porseleinhoen, steltkluut, kokmeeuw, zwarte stern, velduil.

(Sloterdijk, 3e blz.)

Apart zou ik willen vermelden 15 broedvogelsoorten van de naaste omgeving, waaronder te verstaan: een strook van 100 m breed rondom het gehele gebied, waarvan mag worden verwacht, dat zij in het onderzoekgebied kunnen worden waargenomen:
torenvalk (2 paar), houtduif, kerkuil (eerst een paar, later solitair ex; veel zwervend), steenuil (eerst een paar in nestkast, later 1 adult. ex. dood gevonden), ransuil (1 jong), boerenwaluw, zwarte kraai, ekster, spreeuw, winterkoning, koolmees, merel, roodborst, huismus, ringmus.

Fouragerend en op doortrek

werden buiten de vogels van beide vorige categorieën de volgende 69 soorten waargenomen:

Dodaars (6/5/'67 + 60 exx, Aut.), blauwe reiger, roerdomp (vanaf 15/10 - 31/12/'67 steeds 1 ex), Lepelaar (3/4-23/9/'67 van 2 tot 30 exx), Zomertaling (mei '67 tientallen exx), Krakeend (30/10/'66 ♂ + ♀, 5/11/'66 3 exx, 5/1/'67 3 paar), Smient (bijv. 8/4/'67 500 exx, oct. 1967 3000 exx), Pijlstaart (oct. 1967 50 exx), Tafeleend (Oct. 1967 150 exx), Brilduiker (5/1/'67 1 ♀ - dR), Grote Zaagbek, Nonnetje (19/2/'67 ♂ + 4 ♀ - dR), Grauwe Gans (28/4 1 ex - Fr; 27/5 47 exx - Bu), Buizerd (6/5/'67, 1 ex - Op), Bruine Kiekendief (20/8 - 29/9/'66 1-3 exx, 6/5/'67 1 ex, 22/7/'67-24/9/'67 1-3 exx), Blauwe Kiekendief (13-20/11/'66 2 exx - Do), Boomvalk (mei-sept. '67 af en toe 1 ex), Slechtvalk (4/11/'66 1 ex, van Tilburg; 15/10/'67 1 ex - Aut.+ Alberts); Porseleinhoen (12/8/'67 1 ex - Fr; 16/9/'67 1 ex - Bu; 29-31/12/'67 1 ex - dR), Bontbekplevier (mei 1967 500 exx), Zilverplevier (25/3/'67 1 ex - Sw; oct.-dec. '67 meerdere exx); Goudplevier (7/5/'67 1 ex in prachtkleed - Aut.), Steenloper (29/4/'67 1 ex - Fr; 1/5/'67 2 exx - dR, Ve; 20/5/'67 1 ex - Od; 26/5/'67 1 ex - Fr; 2/6/'67 1 ex - Bu), Bokje (dec. 1967 1-8 exx), Wulp, Regenwulp, Rosse Grutto (apr. en mei 1967 25 exx, 8-9/10/'67 3 exx - dR/Ve), Witgatje (soms tot 40 exx), Bosruiter, Oeverloper, Zwarte Ruiter (tot in dec. '67 3 exx), Groenpootruiter, Kleine Strandloper (mei tot dec. '67 10-150 exx), Temminck's Strandloper (mei '67 6 exx; 3/8 1 ex - Bu), Bonte strandloper (winter 1966/'67 75 exx, mei '67 500 exx, 21/12/'67 200 exx), Kanoetstrandloper (10/9/'66 2 exx - Wa; 9/10/'66 3 exx - Or, dR), Krombekstrandloper (18/9/'66 20 exx, 9/5/'67 2 exx - Bu), Kemphaan (mei '67 300 exx), Grote Mantelmeeuw, Br. + Scand. Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Noordse stern (7/8/67 1 ex Ve), Zwarte Stern (Mei 1967 50 exx), Holenduif, Koekoek, Velduil (sept.-dec. '67, 1-3 exx - Fr, Aut.), Gierzwaluw, Strandleeuwerik (winter 1966/'67 25 exx, winter 1967/'68 20 exx), Huiswaluw, Bonte kraai (wintermaanden 1-20 exx), Roek (5/11/'66 1 ex - Sw), Kauw, Gaai, Pimpelmees, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Tapuit (31/3-4/11/'67 steeds minstens 1 ex; 16/9/'67 10 exx - Fr), Paapje (24/8 - 24/9/'67 2-3 exx - Fr, Aut.) Heggemus, Groenling, Putter (vanaf juli '67 4 exx), Kneu, Frater (winter 1966/'67 en 1967/'68 aanwezig; 13/11/'66 200 exx - Do; 13/1/'67 50 exx; 29/12/'67 75 exx), Vink, Keep (soms tot 100 exx), Sneeuwgorz (enkele indrukken: 20/11/'66 110 exx - Do; 13/1/'67 180 exx - Bu; 3/12/'67 50 exx - Fr; 29/12/'67 100 exx - dR).

Niet waargenomen zijn:

purperreiger, drieteenstrandloper, grote lijster, roodborsttapuit, grote karekiet.

(Sloterdijk, 4e blz.)

De grenzen van het waarnemingsgebied zijn nu als volgt vastgesteld: spoorlijn Amsterdam-Haarlem vanaf station Sloterdijk tot Halfweg, dan Spaarnwouderdijk tot ter hoogte van de Nieuwe Haven; langs de Nieuwe Velserweg naar de brug over zijkanaal F; vervolgens Noordzeekanaal tot aan Fordhaven; dan door as van Fordhaven tot aan Nieuwe Velserweg en deze volgen tot Coentunnelweg, en zo naar Station Sloterdijk.

In de periode van 1 oktober 1966 t/m 31 december 1967 zijn in totaal 143 vogelsoorten waargenomen door in totaal 20 waarnemers die ongeveer 250 maal het gebied bezocht hebben.

In deze periode zijn 12 soorten voor het eerst in dit gebied gezien, wat het totaal aantal soorten sinds 1 januari 1962 op 177 brengt (met ondersoorten mee, op 183).

Samensteller: A. Hartog
Admiralengracht 205hs,
Amsterdam.

Ha/vDr
maart 1968