

Verslag broedseizoen nestkasten op het Vogeleiland 1969

Er hingen dit jaar 12 nestkasten op het Vogeleiland zèlf. Twee waren van een afwijkend type (z.g. selectieve kasten, kleiner dan de andere); deze bleven onbezet.

De overige 10 kasten werden bewoond door 1 pimpelmees, 5 koolmezen, 3 ringmussen en 1 spreeuw. Twee ringmussen hadden een 2de broedsel, en in de kast van de spreeuw kwam later nog een huismus.

Hieronder volgt een tabel. In de 3de kolom worden resp. vermeld: aantal eieren die gelegd werden, aantal uitgekomen eieren, en aantal niet-uitgekomen eieren.

Alle opgegeven data en tijden kunnen hoogstens 1 dag verschillen van de eigenlijke waarden. We controleerden n.l. maar 1 keer per week, zodat er gemakkelijk een fout van 1 dag kan optreden.

<u>soort</u>	<u>kast nr.</u>	<u>aantal eieren</u>	<u>datum 1ste ei</u>	<u>datum laatste ei</u>	<u>uitkomen eieren</u>	<u>uitvliegen jongen</u>	<u>bd</u>	<u>nv</u>
<u>spreeuw</u>	9	5 4 1	23-4	26-4	6-5	24-5	11	19
<u>huismus</u>	9*	5 5? 0	17-6	21-6				
<u>ringmus</u>	1	7 6 1	5-5	12-5	25-5	5-6	14	12
idem	2	7 7 0	6-5	12-5	26-5	6-6	14	12
idem	10	6 6 0	7-5	12-5	26-5	6-6	14	12
idem	2*	5 4 1	9-6	13-6	27-6	8-7	14	12
idem	10*	3 3 0	12-6	14-6	27-6	10-7	14	14
<u>koolmees</u>	4	10 10 0	1-5	10-5	26-5	9-6	16	15
idem	5	9 8 1	25-4	3-5	16-5	30-5	13	15
idem	7	10 9 1	27-4	6-5	21-5	6-6	15	17
idem	8	10 9 1	7-5	16-5	28-5	13-6	12	17
idem	11	9 9 0	28-4	6-5	18-5	1-6	12	15
<u>pimpelmees</u>	12	10 8 2	28-4	8-5	21-5	7-6	12	18

bd = broedduur in dagen

nv = nestverblijf in dagen.

\* betekent: 2e legsel of 2e bewoner van zelfde kast.

Het contrôleverloop van de huismus was als volgt: 19/6 2 eieren, 28/6 5 eieren, 9/7 1 dood jong. De mus kan zijn gaan broeden op 21/6, maar de jongen kunnen onmogelijk 19 dagen later uitgevlogen zijn. Er moet dus een verstoring zijn opgetreden, die tot gevolg had dat er niet één huismus uitvloog.

Alles opgeteld zijn er grootgebracht:

spreeuw 4 jongen (sterfte 20 %)      koolmees 45 jongen (sterfte 6 %)  
ringmus 26 jongen (sterfte 7 %)      pimpelmees 8 jongen (sterfte 20 %)  
huismus 0 jongen (sterfte 100 %)

In het volgende lijstje staan de gemiddelde broedduur en nestverblijf van de vogels van het Vogeleiland naast de gemiddelden volgens J.G.Th. van Nes: "De eieren en nesten van onze vogels".

spreeuw	11	19	(Vogeleiland)	12	21½	(van Nes)
ringmus	14	12½		13½	17	
koolmees	13½	16		13½	17½	
pimpelmees	12	18		13½	17½	

De tijden van nestverblijf zijn bij spreeuw en koolmees iets en bij ringmus zelfs belangrijk korter dan bij van Nes. Zou dit verband houden met het bijzonder gunstig biotoop van het Vogeleiland ?

Verantwoordelijk voor dit verslag is Henk Sandee, (N.J.N.)  
Erik de Roodestraat 1,  
Amsterdam - West