

INVENTARISATIE BOTSHOL, 1/9/1969 - 1/9/1970

(Vgl. voor vorige inventarisaties:

Med. Blad KNNV VWG Amsterdam, 6e jrg., nr. 3-4, blz. 44-45

Med. Blad KNNV VWG Amsterdam, 8e jrg., nr. 2, blz. 4-6)

Evenals in voorgaande jaren, inventariseerde o.g. met hulp van mevr. J. Alberts en mevr. N. van der Meijden het waterschap Botshol (grootte: ca. 295 ha). In principe is er alleen op zang geïnventariseerd en nestvondsten berusten dan ook op louter toeval, behalve die van de kokmeeuw.

Evenals in het inventarisatieseeizoen 1969 werden de resultaten van de afzonderlijke inventarisaties van A. Timmerman Jr., J. van de Wiel en o.g. samengevoegd tot één verslag.

Doordat de Hr. Sj. Braaksma in het broedseizoen van 1970 enige malen de afgesloten Kloosterkolk bezocht en ons zijn waarnemingen toezond, kon voor het eerst deze "eendenkooi" bij het overzicht betrokken worden.

In bovengenoemde periode werden in Botshol totaal 114 vogelsoorten waargenomen, waaronder 54 broedvogelsoorten. Deze broedvogels waren:

Fuut - 15 broedterritoria + 3 in Kloosterkolk. Eerste jongen op 5 mei 1970; 3 broedsels verloren gegaan. Excl. de Kloosterkolk hebben 11 paar minstens 23 jongen grootgebracht. Voorts waren steeds circa 5-10 solitaire futen aanwezig op de Grote Wijde. Botshol dient op drukke dagen als refugium voor futen van de Vinkeveense plassen.

Woudaapje - 8 paar. Eerste waarneming in 1970 op 7 mei. Meerdere jongen, bijv. 12 juli 1970 een ♀ met 2 jongen en een rondvliegend alarmerend mannetje.

Roerdomp - 1 paar; opvallend weinig waargenomen dit jaar na 7 mei.

Wilde eend - broedvogel in meer dan 100 paar; op 3 mei 1970 nestvondst van 26 eieren door 3 vrouwtjes gelegd.

Wintertaling - 1 paar. Geen jongen waargenomen of nestvondst; echter wel constant aanwezig.

Zomertaling - 4 - 6 paar. Geen jongen noch nestvondst; territoria met name in weilandengebied.

Krakeend - 1 paar. Op 14 juni 1970 een ♀ met 3 juv.; 23 juni 1970: ♀ vertoonde "injury-feigning".

Slobeend - 6 - 8 paar. O.a. op 6 en 13 juni waarnemingen van nog niet vliegvlugge pulli. De Kloosterkolk werd vaak benut als rustplaats.

Krooneend - 8 - 10 paar. Op 24 mei 1970 waren er volgens de opzichter, de Hr. v.d. Plas, reeds 2 tomen met jongen. Opvallend veel tomen van 2 jongen, mogelijk doordat ongepaarde wijfjes en moeder-eend elkaar fel beconcurrerden.

Kuifeend - 4 paar. Nestvondsten op 24 mei en 11 juni 1970. In de winter circa 90 exx op de Grote Wijde.

Tafeleend - 1 paar, vermoedelijk in Kloosterkolk.

Knobbelzwaan - 2 paar verwilderde zwanen in 1970.

Boomvalk - 1 paar. Op 12 juli 1970 nest met drie circa 8 dagen oude jongen.

Torenavalk - 1 paar. Op 21 juni 1970 een nest met 4 eieren; op 31 juli werd 1 groot jong op nest gevoerd.

Patrijs - 1 paar. Op 23 augustus 1970 ♀ met 13 jongen in weilanden-gebied.

Fazant - aantal broedparen moeilijk te schatten; in najaar zeker meer dan 100 exx aanwezig.

Waterral - 4 paar: zwijgzame en vrij schuwe vogel.

Waterhoen - 10 - 15 paren. Totaal 7 nestvondsten en weinig waarnemingen van jongen.

Meerkoet - 80 - 90 paar. Totaal 52 nestvondsten. Reeds op 26 april nest met 5 pulli en 1 ei. Op 14 september 1969 werd een vrijwel geheel albino exemplaar waargenomen.

Scholekster - 3 paar in weilandengebied van Botshol.

Kievit - 10 paar in weilandengebied van Botshol en 2 paar op zeer droog gemaaid rietland.

(Botshol - 2e blz.)

Watersnip - 3 paar. Vooral op najaarstrek aanwezig op z.g. "snippebedjes"; 14 september 1969 30 exx.

Grutto - 7 paar in weidegebied van Botshol.

Tureluur - 3 paar in weidegebied van Botshol.

Kokmeeuw - eerste nesten op 26 april 1970. Op 14 mei werden 362 eieren geraapt en op 11 juni nogmaals 66 eieren. In 1970 zijn maximaal 10 jongen grootgekomen.

Zwarte stern - 31 paren; 2 nesten verloren gegaan t.g.v. recreatie.

Alle 16 nesten in de afgesloten Fortgracht waren succesvol. Op 23 juni 1970 nog 7 van de 9 nesten in andere kolonie met eieren.

Houtduif - 18-22 paar. Tot laat in de lente nog in vrij grote groepen aanwezig, bijv. 26 april 1970 circa 90 exx.

Tortelduif - 12-15 paar. Eerste waarneming op 5 mei 1970.

Koekoek - 5-7 exemplaren aanwezig; op 24 mei 1970 ook rossige kleurfase.

Ransuil - 5 paar. Slechts 3 paar waren succesvol. Eén paar startte met 6 eieren en eindigde met 4 jongen. In totaal zijn 10 jongen uitgevlogen.

Winterroestplaats aanwezig op Dunboomeiland.

Veldleeuwerik - 2 paar in weidegebied van Botshol.

<u>Witte kwikstaart</u>	1 terr.	<u>Zwartkop</u>	1 terr.
<u>Winterkoning</u>	17 terr. + 3	<u>Tuinfluiters</u>	15 terr. + 2
<u>Heggemus</u>	4 terr.	<u>Grasmus</u>	3 terr.
<u>Zanglijster</u>	3 terr. + 1	<u>Fitis</u>	46 terr. + 3
<u>Merel</u>	15 terr. + 1	<u>Tjiftjaf</u>	17 terr. + 2
<u>Sprinkhaanrietzanger</u>	2 terr.	<u>Koolmees</u>	3 terr.
<u>Snor</u>	9 terr.	<u>Matkop</u>	5 terr. + 1 of 2
<u>Grote karekiet</u>	8 terr.	<u>Rietgors</u>	32 terr. + 2
<u>Kleine karekiet</u>	19 terr. + 4	<u>Kneu</u>	5-7 terr.
<u>Rietzanger</u>	79 terr. + 2	<u>Zwarte kraai</u>	5 terr. + 1
<u>Spotvogel</u>	2 terr. + 1	<u>Ekster</u>	1 terr.
		<u>Gaai</u>	3 terr.

Bosrietzanger - geen broedvogel in Botshol, wel 1 paar in de Kloosterkolk.

Vink - geen broedvogel in Botshol, wel 1 paar in de Kloosterkolk.

- Naast de als broedvogels vermelde soorten zijn nog 58 soorten waargenomen. Een vrij willekeurige greep toont ons:

Roodhalsfuut - Ook in 1970 overzomerde 1 ad. ex in prachtkleed op Grote Wijde en Kloosterkolk.

Geoorde fuut - Op 30 april en 7 mei '70 1 ad. ex in prachtkleed op Grote Wijde.

Rietgans - 15 februari 1970: 55 exx fouragerend in polder ten Zuiden van Botshol.

Bruine kiekendief - in herfst 1969, voorjaar en nazomer 1970 meerdere malen in o-kleed waargenomen.

Grauwe kiekendief - op 5 mei 1970 twee maal een o jagend in Onverdeelde Helft.

Beflijster - 7 mei 1970, 1 ex in de Noordelijke Polder.

Paapje - 7 mei 1970, 1 zingende o aan de zuidrand van de Noord. Polder.

Fluiter - op 3 mei 1970 werd 1 zingend ex gehoord in de Zeven Morgen.

Voorts werden in de zomer nog fouragerend waargenomen: aalscholver, purperreiger en lepelaar. Bovendien werden in de trektijd veel overvliegende steltlopers genoteerd als regenwulp, wulp, groenpootruiter, zwarte ruiter, witgatje, oeverloper en kemphaan.

Mag ik U tot slot nog wijzen op "Botshol-vogelverslag 1970". In dit 38 pagina's tellende verslag wordt in het kader van N-70 de belangrijkheid van Botshol als afgesloten natuurgebied nogeens extra aangetoond, en worden de middelen besproken om de rust te vergroten.

A. Hartog,
Admiralengracht 205hs, Amsterdam - 1015.

AHa/vDr
maart 1971