

- Van 29 mei t/m 12 juni 1971 bezochten 7 leden van KNNV VWG Amsterdam, 2 leden van VWG het Gooi, en 2 leden van de Arbeitsgemeinschaft Wal-kenried de Donaudelta. De heen- en terugreis werd per vliegtuig gemaakt, van Schiphol naar Constanta; de eerste en de laatste nacht werd doorgebracht in appartementen te Eforie-Sud.

Zondag, 30 mei, reden wij naar de camping te Murighiol. Als gevolg van het noodweer was de doorgaande weg overstroomd, zodat een enorme omweg gemaakt moest worden; dit leverde ons veel kleine klapeksters (nestvondst) en kalenderleeuwerikken op, enkele hopen en bijeneters, plus 3 steenuilen.

Gedurende 8 dagen verbleven wij in kleine houten huisjes op de camping te Murighiol. Het weer was vrijwel steeds uitstekend: warm en zonnig (ca. 30° C.), slechts een enkele keer (goddank) wat bewolkter.

De camping is gelegen aan de rand van de moerasbossen, rietvelden, grote en kleine plassen, die de zuidelijke arm van de Donau - de Bratul Sf. Gheorge - omzomen.

Op het meer voor de camping waren kwakken aan het vissen op de steunen voor de visnetten en visten pelikanen (maximaal 600; eenmaal circa 150 op ongeveer 60 m afstand); doken witwangsterns, zwarte sterns, witvleugelsterns (2 x) en lachsterns (2 x). Er vlogen blauwe reigers, purperreigers, kleine en grote zilverreigers, ralreigers, woudaapjes en zwarte ibissen voorbij, terwijl in de schemering de krekkelzanger nog te horen was, later op de avond overstemd door de vele duizenden kikkers, die ijverig door de plaatselijke bevolking gevangen werden.

Wandelingen langs het moerasgebied leverden vooral veel ralreigers en kleine zilverreigers; krooneend, witoogend, winter-taling fourageren daar veel; boven het riet vlogen groepen pelikanen, met af en toe een - meestal solitair vliegende - kroeskop-pelikaan, dwergaalscholwers, ooievaars (elk zich respecterend dorp had minstens 1 paar) en bruine kiekendieven.

In de soms steile hellingen broedden bijeneters (bijv. 4 kolonies met in totaal circa 100 paar binnen 1 km; een kolonie van 15 paar was in enkele dagen geheel afgegraven door enkele arbeiders !); scharrelaars - soms tot 8 bijeen - lieten hun vliegcapriolen zien, en opvallend veel baardmezen fouragerden er.

Op een korte tocht met vissers de delta in, zagen wij o.a. zeer fraai een sakervalk. Een tweedaagse tocht per boot naar Caraorman leverde ons o.a. veel roerdampen (meer dan aan de rand), 2 adulte zeearenden, en buidelmeezen. Binnen 600 m lagen minstens 6 territoria van de buidelmeezen; nesten ervan werden ontdekt, en - tot stomme verbazing van de vissers - alleen gefotografeerd. Nestbouw, zang en sub-zang werden geregistreerd. Caraorman - een oud duingebied, door de voortdurende uitbreiding van de delta (momenteel 434.000 ha) als het ware ingehaald, werd bezocht vanwege de griel, die wij er 's avonds dan ook prachtig hoorden.

Op diverse excursies in de omgeving werden o.a. waargenomen: ad. + juv. steenarend, slangenarend (enkele malen), eerstejaars havikarend (2 x), zwarte en rode wouw, slechtvalk, blauwe kiekendief, rouwmees (eenmaal op een steile, droge, steenachtige, schaars met struken begroeide helling).

Een uniek zoutwatermeertje achter Murighiol leverde ons 6 paar roodhalsfuut, 70 exx geoorde fuut, dwergmeeuw (nestvondst), 6 exx stelkluit, etc. In een droog populierenbos namen wij 4 roze spreuwen waar.

De overige dagen verbleven wij in soortgelijke houten huisjes bij Babadag, te midden van zachtglooiende heuvels begroeid met laag loofhout. Een bijzonder vogelrijk gebied, met o.a.: bosuil, dwergooruil, nachtzwaluw, draaihals, nachtegaal, spotvogel (vervangt als het ware de ontbrekende fitis), bergfluitier, kruisbek, en tevens vrij veel stootvogels: buizerd, wespendif, schreeuwend, slangenarend, sakervalk.

Tweemaal werd nog *Cetatea Histria* bezocht: een soort schorrengebied aan de rand van een groot, zeer ondiep zoetwatermeer, waar o.a. broedden: strandplevier, kluut, dwergmeeuw, vorkstaartplevier (kolonie van ca. 20 paar), dwergstern, balkan gele kwikstaart en kortteenleeuwerik (nestvondst).

In dit prachtige gebied werden ook nog waargenomen witkopeend, zilverplevier, grauwe franjepoot, krombekstrandloper, breedbekstrandloper, poelruiter, zwartkopmeeuw, vorkstaartmeeuw, lachstern, enz. .

Deze zeer beknopte weergave geeft misschien een idee van deze werkelijk unieke tocht met in totaal 174 soorten.

- Van zondag 12 september t/m zaterdag 18 september 1971 verbleven 4 leden van KNNV VWG Amsterdam en 4 leden van Arbeitsgemeinschaft Walkenried in Skane, de zuidelijke provincie van Zweden, en dan vooral op de meest zuidelijke punt, n.l. Falsterbo schiereiland.

Zoals bekend, vindt hier sterke stuwingsplaats in de trek der diverse vogelsoorten op hun weg naar hun overwinteringsgebied.

Trekwaarnemingen werden in het algemeen 's morgens verricht op de uiterst zuidelijk gelegen golfbanen, waarop ook de vuurtoren staat, en later op de dag op het enkele km noordelijker gelegen heideveld.

Het voornaamste doel van de reis, het waarnemen van massale stootvogeltrek, is slechts zeer mager aan bod gekomen. In totaal werden gedurende 19 uur, verdeeld over 5 morgens, waargenomen: ongeveer 710 buizerd, 3 ruigpootbuizerd, 80 sperwer, 1 juv. havik, 140 wespendif, 2 bruine en 7 blauwe kiekendief, 2 visarend en 2 smelleken.

De bosjes rondom de vuurtoren zijn geweldig vogelrijk, doordat zij vrijwel de enige dekking bieden op de zuidpunt. Gedurende deze week werden o.a. waargenomen: grote, middelste en kleine bonte specht, zwarte specht, draaihals (maximaal 3 exx), pestvogel (15 exx), grauwe vliegenvanger, bonte en kleine vliegenvanger (max. 3 exx), kruisbek en notenkraker (in totaal 8 waarnemingen).

Ook de rest van de golfbanen leverde interessante vogels, zoals zeekoet (overvliegend), hop (zeldzaam voor Zweden), boomleeuwerik, duinpieper, boompieper, oeverpieper. Elke dag werden nog meerdere exx van de vier "zwaluw"-soorten en van de koekoek waargenomen. Het uiterste puntje van de Golfbana - Nabben- leverde veel overgenomen. zee trekkende vogels als roodhalsfuut, aalscholver, eidereend, middelste zaagbek en grote stern.

De noordelijke helft van het schiereiland wordt gevormd door een kwelderachtig landschap met verwaarloosde, schrale graslanden.