

- + (213) 323. Goudvink
- kampeerterrein:
31/10 2 exx, waarvan minstens 1 ♂, (K. en L. Straatman)
2/11 en 3/11 1 ♂ (K. Straatman)
9/11 1 ♂ (Buurma)
12/11 tot 24/11 bij herhaling 2 ♂ en 1 ♀ K. Straatman)
24/11 2 ♀ (K. en L. Straatman)
M.i.v. 27/11 2 ♂ en 2 ♀.
In december nog steeds goudvinken aanwezig, o.a.:
26/12 2 ♂ en 3 ♀. (Straatman)
- elders:
17/11 1 paar dalletje achter start (fam. Bakx)
26/11 1 ♀ Koenenkade bij ONM Oost (de Groot)
2/12 + 12 exx Poelpad, in elzen (de Groot)
3/12 nog enkele exx aldaar gehoord (de Groot)
5/12 1 paar gezien Oeverland A'v. Poel; 1 ex horen roepen
zuidelijk deel van open-drainage terrein (Hartog, mevr. Alberts)
- (216) 330. Keep Na 12/4 pas weer waarnemingen m.i.v.:
7/10 minstens 2 exx. V'eil. (Brander)
hele kwartaal gering in aantal aan de Noordkant,
maar in Schinkelpolder regelmatig waargenomen (de Groot)
2/12 veel exx kamp. terrein (Straatman)
- + (201) 331. Geelgors
27/10 1 ex over excursiepad ONM (v.d. Schot)
- (202) 343. Rietgors november-waarnemingen:
8/11 1 ex ONM (mej. van Drooge) horen roepen.
27/11 1 ex Meerpad, roepend (Swart)

Samengesteld door:
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI,
Amsterdam - 1009

december 1971
vDr/vDr

Waarneming van een waterpieper in het Amsterdamse Bos op 3-11-1971

Op woensdag, 3/11/1971, liep o.g. over het excursiepad door de Oeverlanden van het Nieuwe Meer. Het was zwaar bewolkt, maar droog weer. Om + 16 uur 30 werd mijn aandacht getrokken door 2 à 3 piepers, die 1 à 2 keer heen en weer vlogen van het westelijk naar het oostelijk deel van dit oeverland. Het geluid, dat deze vogels maakten, kan door mij het best worden weergegeven als "ierrp-ierrp", hetgeen qua toonhoogte overeenkwam met dat van de graspieper (*anthus pratensis*). De sterkte en felheid, waarmee dit geluid werd voortgebracht, had echter geen enkele overeenkomst met dat van de graspieper; dit leek veel meer op dat van de oeverpieper (*anthus spinoletta littoralis* of *petrosus*), zoals bekend de subspecies van de waterpieper.

Dat het hier echter geen oeverpieper betrof, werd mij enkele minuten later duidelijk. 2 à 3 exx vielen n.l. in op het oeverland, op 5 à 7 m afstand van de bank waarop ik stond. Ik was in de gelegenheid 1 ex gedurende een tiental seconden te bekijken. De beschrijving luidt als volgt:
De bovendelen, waaronder te verstaan de rug, vleugel, stuit en staartveren, waren zo goed als egaal, muisgrijs met alleen bij de buitenste staartpenen een opvallend helderwitte kleur in vergelijking tot de grijze bovendelen. Helaas kreeg ik de kop niet te zien, doordat deze achter wat dor riet verscholen ging, zodat over een eventuele oogstreep niets te zeggen valt. De vlucht deed wat zwaarder en leuwerik-achtiger aan dan die van de graspieper.

M. van den Berg