

	1972	1973
5. Fuut	4	4 paar, 3 met gesl. broedsel, 1 hiervan zelfs met 2 broedsels.
? 20. Blauwe reiger	0	2 ? (buiten "Nk")
33. Wilde eend	ng	ng
35. Zomertaling	0	1
39. Slobeend	1	1 minstens
42. Kuifeend	+ 5	3 minstens
89. Boomvalk	1	1
94. Torenavalk	1	1
98. Patrijs	1	1
100. Fazant	ng	ng
102. Waterral	0	0
107. Waterhoen	ng	ng
108. Meerkoet	ng	ng
112. Scholekster	3 à 4 p	zie volgend Med. Blad
114. Kievit	Meerzicht 6 à 8 p ONM ng	zie volgend Med. Blad
123. Watersnip	0	0
131. Grutto	4 à 5 p	zie volgend Med. Blad
136. Tureluur	3 à 4 p	zie volgend Med. Blad
192. Houtduif	ng	ng
193. Tortelduif	1	1
195. Koekoek	2♀ + 3♂	2 ♀ + 3 ♂
203. Bosuil	2	2, waarvan 1 verstoord
204. Ransuil	1 (mislukt)	2 ("Nk" 1)
? 214. Groene specht	0	1 ?
216. Grote bonte specht	4	5 à 6
? 217. Kleine bonte specht	1	1 ?
226. Boerenzwaluw	ng	ng, minstens 4, waarvan 3 "Nk"
229. Wielewaal	("Nk" 2) 3	2
232. Zwarte kraai	ng	ng
235. Ekster	ng	ng
237. Vlaamse gaai	ng	ng
238. Koolmees	ng	ng
239. Pimpelmees	ng	ng
243. Matkop	5	8
244. Staartmees	(Nk" 6) 8	9 ("Nk" 7)
247. Boomkruiper	5	7 à 8 ("Nk" 5 à 6)

(inv. Noordkant - 1973, 2e blz.)	1972	1973
248. Winterkoning ("Nk" 21)	25 + 2x $\frac{1}{2}$	27 ("Nk" 23)
251. Grote lijster	1	1
253. Zanglijster	ng	og, minstens 10
259. Merel	ng	ng
265. Gekraagde roodstaart	0	0
267. Nachtegaal ("Nk" 4)	7	5 ("Nk" 2)
269. Roodborst	ng	+ 11
275. Kleine karekiet	3 à 4	7
277. Bosrietzanger	5	6
277. Rietzanger	6	4
279. Spotvogel	0	0
280. Zwartkop ("Nk" 7)	10	9 ("Nk" 6)
282. Tuinfluiter ("Nk" 7)	+ 8	16 à 19 ("Nk" 14 à 15)
287. Fitis ("Nk" 19)	24	18 ("Nk" 15)
288. Tjiftjaf ("Nk" 10)	13	17 ("Nk" 12)
? 294. Grauwe vliegenvanger	1	1 ?
298. Heggemus ("Nk" 11)	15	14 ("Nk" 10)
304. Witte kwikstaart	1	2
312. Spreeuw	ng	ng
? 315. Groenling ("Nk" 1)	2	1 ?
316. Putter ("Nk" 0)	1	0
329. Vink	3 à 4	4
343. Rietgors	5	7
347. Ringmus	2	1

In totaal 50 soorten broedvogel, alsmede 5 met een vraagteken, t.a.v. welke de verzamelde gegevens onvoldoende waren om een positieve uitspraak te doen. Van 36 soorten werden de territoria geteld.

ng = niet geteld. og = onvolledig geteld.

"Nk" geeft de getallen voor de "oorspronkelijke" Noordkant, voorzover deze afwijken van het totaal voor het thans geïnventariseerde gebied.

T.a.v. de weidevogels, ook voorzover deze in ONM broedden, volgen de cijfers in het volgend Mededelingenblad.

Ten opzichte van 1972 viel de putter af, terwijl kleine bonte specht, grauwe vliegenvanger en groenling dubieus werden. Een positieve aanwinst was de zomertaling, terwijl blauwe reiger en groene specht werden toegevoegd met een ?.

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de gedetailleerde gegevens in het kwartaal-overzicht Amsterdamse Bos, in dit zelfde Mededelingenblad.

Aan de inventarisatie werkten mee: Mej. A.C. Arntzen, mevr. M.G.J. Geers, alsmede Mej. Mr. J.H.U. van Drooge, die tevens de gegevens uitwerkte.

juli 1973, vDr/vDr.