

Ondanks de ook hier sterker geworden recreatiedruk werden de volgende vogels waargenomen:

fouragerende wulpen en rosse grutto's, ca. 20 zittende adulte en juveniele grote sterns, overvliegende smienten (18 exx, richting ZW) en diverse langsvliegende eidereenden en zwarte zeeëenden. Een zwartkopmeeuw in winterkleed streek neer tussen honderden stormmeeuwen, zilvermeeuwen, grote en kleine mantelmeeuwen op de Razende Bol. Tweemaal zorgde een kleine jager voor de nodige opschudding onder de meeuwen (en de vogelaars); een alk vloog langs en streek ver weg neer, en een roodhalsfuut zwom op de sterke eb-stroom voor de boot uit.

Na enige uren vrij doelloos kruisen enkele kilometers uit de kust, waarbij een jonge Jan van Gent en diverse zwarte zeeëenden langsvlogen, werd besloten dichters langs de kust terug te varen. In totaal werden toen nog 11 Jan van Genten waargenomen en nog 4 kleine jagers. Twee jonge Jan van Genten passeerden op circa 10 m; een kleine jager scheerde op masthoogte over het schip, terwijl een jonge kleine jager vlak voor de boeg opvloog.

Al met al een geweldige excursie. Tot slot werd aan de deelnemers nog vers zeebanket meegegeven.

Excursie Flevopolders, 6 oktober 1973.

Vrij dichte mist speelde de 14 deelnemers vooral in de ochtend parten, zodat weinig werd gezien. Opvallend waren wel de honderden baardmezen langs de dijk bij het Oostvaardersdiep; toen de mist even dunner werd, trachtten er bij de eerste werkhaven zeker 150 exx boven de nevels te komen.

Bij de Knardijk trok de mist op, en toen bleek dat er in Oostelijk Flevoland honderden grauwe ganzen zaten plus 1 kolgans en 1 indische gans.

In Zuidelijk Flevoland werd van af de Knardijk en van uit de schuilhut van de Rijksdienst IJsselmeerpolders o.a. waargenomen:

honderden slobbeenden en wintertalingen, tientallen pijlstaarten en bergeenden, zilverplevieren, goudplevieren, honderden kluten, kemphanen en bonte strandlopers, ca. 15 dwergmeeuwen, 1 fouragerende zwarte stern en 3 rosse grutto's.

Een rit door Oostelijk Flevoland leverde vrij veel torenvalken op; alleen al langs de Torenvalkweg werden er 14 waargenomen.

Tevens werd diverse malen een blauwe kiekendief waargenomen, zowel in mannelijk als vrouwelijk kleed.

Een smelleken in vrouwelijk kleed liet zich gedurende 10 minuten, zittend op een aardkluit, bewonderen.

Vervolgens werd in de richting van de Houtribsluizen gereden.

Op het water ervoor zaten honderden kuif- en tafeleenden, plus een drietal geoorde futen of kuifduikers. Een plotseling aanrollende mistbank met een zicht van 25 m maakte een eind aan de discussie over de juiste determinatie, en aan de excursie.

NB: In enkele gevallen kan een determinatie alleen geschieden, wanneer de geoorde fuut/kuifduiker zich zeer dichtbij bevindt. Het doorlezen van diverse boeken als: Vogelgids, Gids voor de Vogels van Europa, The Handbook of British Birds (vdl. IV), Atlas van de Vogels in België en West-Europa, De Nederlandsche Vogels (deel II), Die Vögel Mitteleuropas (Teil 1), wekt sterk de illusie, dat deze soorten in winterkleed vrij gemakkelijk in het veld te determineren zijn. De kuifduiker heeft een plattere kop, verder naar achteren reikende witte wangen die elkaar soms lijken te raken in de nek, zwart boven het oog, een bontere kop-tekening, witte hals, niet zo rechte nekhouding, rechte, schijnbaar vrij zware snavel die donkergekleurd is en een lichte punt heeft, en een witte vlek tussen oog en snavelbasis.

- 4 -

Alle genoemde kenmerken - behalve snavelkleur en witte vlek tussen oog en snavelbasis - schijnen echter zeer variabel te zijn; zo kan de snavel van jonge kuifduikers zeer sterk lijken op die van de georde fuut.

AH/vDr, oktober 1973

A. H a r t o g

O.g. heeft o.g. in 1973 een drietal vogelexcursies geleid van de KNNV afd. Amsterdam. Een kort overzicht van waarnemingen volgt hieronder:

18 februari 1973 - ganzenexcursie.

Zuid Flevoland, Gooiweg: ca. 2500 kolgans. Goëngahuizen: ca. 9500 kolgans en ca. 8500 brandgans. Sneek: ca. 22000 kolgans en ca. 8000 brandgans. Kampereiland: ca. 6000 kolgans en ca. 100 grauwe gans.

2 september 1973 - Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Veel putters, paapjes, tapuiten, gekraagde en zwarte roodstaarten, driemaal boomvalk. Omgeving Kromme Schusterkanaal, G 36 en Zwaneplas: 2 dodaars, 1 georde fuut (prachtkleed), juv. witoogend, ca. 50 krakeenden, driemaal waarneming van tenminste 2 exemplaren van de visarend, en fouragerende draaihals.

16 september 1973 - Texel.

De Bol: bonte en kleine strandlopers, steenlopers, 1 kanoetstrandloper, honderden smienten, wintertalingen, slobeenden, pijlstaarten, scholeksters en tureluurs.

Moestuintjes: goudhaantjes, bonte vliegenvanger, paapjes, tapuiten, zwartkop.

Strand: grote sterns, rosse grutto's, drieteenstrandlopers, bontbekplevieren.

De Slufter-duinen: gekraagde en zwarte roodstaarten, bonte vliegvangers, fitis, tjiftjaf en 1 spotvogel.

De Slufter-vallei: 1 zilverplevier, bontbekplevieren, bonte en kleine strandloper.

Mokbaai: tientallen wintertalingen, slobeenden, bergeenden, pijlstaarten, wulpen, rosse grutto's en goudplevieren.

A. Hartog

Waarnemingen AMSTELVEEN, juli en augustus 1973.

IJsvogel, 24/8 en 27/8, de Braak (Koningen)

Groene specht, 17/7 Thijssse park (Koningen)

Boerenzwaluw, 2 broedsels (Koningen, Warendorf, Stritter) Thijsssepark.

Tuinfluitier, 4/7 3 exx (Warendorf, Stritter) Thijsssepark.

4/7 1 ex De Braak (idem)

Fitis, 4/7 1 Thijsssepark, 1 De Braak (Warendorf, Stritter)

12/7 nest met 4 jongen Thijsssepark (Koningen)

Grauwe vliegenvanger, 4/7 paartje met jong Broersepark (War., Stritter).
broedgeval ook geconstateerd door anderen (Koningen)

Boomkruiper, 4/7 Thijsssepark (Warendorf, Stritter)

Groengling, Thijsssepark, regelmatig aanwezig (Koningen).

4/7 (Warendorf, Stritter)

Putter, 2/8 brug Nieuwe Karselaan (Koningen)

Zie tevens "Resultaten met nestkasten in Amstelveen",

Samengesteld door W. Stritter, de Ruyschlaan 187, Amstelveen.

september 1973, WS/vDr