

Zwarte adders

In Nederland zijn 53 waarnemingen bekend van zwarte adders uit de periode 1995-2006 (gegevens Werkgroep Adderonderzoek Nederland). Deze waarnemingen komen vooral uit de provincie Drenthe (50 exemplaren). Zwarte adders worden in Europa voornamelijk aangetroffen op grotere hoogte (>500 m) en in de noordelijkste gedeelten van het verspreidingsgebied. Er is een verband tussen melanisme en klimaatfactoren. Drenthe ligt aan de ondergrens van het zogenoemde 'boreale' gebied. Deze klimaatgordel kenmerkt zich door lagere temperaturen en een daaraan aangepaste flora en fauna. Dat is de belangrijkste verklaring waarom er in Nederland vrijwel geen zwarte adders worden aangetroffen zuidelijker dan Drenthe.

Maar ook dit jaar zijn er weer zwarte adders gezien en gemeld in Drenthe. Zo zag Wim Bosch op zondag 21 april een zwarte adder van circa 70 cm lang vlakbij de Gasterendse Duinen, en kon er een mooie foto van maken. Blijf zwarte adders aan RAVON doorgeven!

**Zwarte adder waargenomen vlakbij de Gasterendse Duinen.
(Foto: Wim Bosch)**



Kattendijkse muurhagedissen

Naar aanleiding van onze oproep in *Schubben & Slijm* nr. 38 (dec 2018) om muurhagedissen op afwijkende (uitzet)locaties te melden ontvingen wij bericht van Kees Musters dat ze ook in Kattendijke (Zeeland, vlak bij Goes) zijn opgedoken. Op 19 april telde hij zeker 11 verschillende muurhagedissen, zowel adult als jongen van vorig jaar, dus er is ook sprake van voortplanting. Hij stuurde een paar bewijsplaatjes mee, zie foto's. Ook kon hij ons melden dat Thom de Bruijn deze muurhagedissen twee jaar geleden al had gezien (en gemeld?). Mensen uit het dorp zeggen dat ze er al zeker 10 jaar zitten.

De locatie te Kattendijke (Zeeland) waar muurhagedissen zijn aangetroffen. (Foto's: Kees Musters)