

CSI Duingebied

Op het virtueel prikbord van CSI Duingebied hingen foto's van slachtoffers, gebied, mogelijke daders, vraagtekens en verklaringen.

Begin juli werden in Zuid-Holland gedurende een paar dagen aan de oever van een vochtige duinvallei tientallen dode padden aangetroffen. Het waren allen rugstreep padden met als uitzondering een boomkikker en een gewone pad. De meesten (vers) gedood, doch ook enkele nog levende, verlamde dieren. Een bizarre waarneming die bovendien tweeledig bleek: er lagen er verzameld op een hoop, secuur van ingewanden ontdaan én als individuen over een aantal meters verspreid, deels aan- of opgevreten. Op de amfibieën, ook die in het water, werden enkele larven of complete eipakketten van de paddenvlieg aangetroffen. Ook een dode huisspitsmuis bevond zich op de plaats delict. Een dergelijke situatie was nog niet eerder waargenomen. Over vaststellen van een daderprofiel gesproken...

Verdachte

Hevige regenval na een zeer droge periode liet toch enkele sporen intact. Onderzoek en overleg met specialisten leverde bewijs voor het ontmaskeren van in ieder geval één verdachte: de bruine rat. Daderprofiel: geraffineerd, zwemmer en zeer argwanend, voorzichtig. Alleseter en cultuurvolger. Knaagt (bijvoorbeeld op ledematen), smult van billen, zachte delen, scheurt, eet wat hij/zij het liefst heeft en ruimt na het tafelen de boel absoluut niet op; de stoffelijke resten worden nog dagen erna op precies dezelfde plek teruggevonden. Precies dat was ook het geval voor een deel van de prooien in het duingebied. Gezien de diversiteit in foerageergedrag en vangst is er echter ook iets voor te zeggen dat twee soorten daders actief waren, zoals de Bunzing. Een roofdier met, afhankelijk van gebied



Dader dode rugstreep pad 'betraapt' door diens pootafdrukken: de bruine rat. (Foto: Ingrid den Boer)

en 'voorraad', onder meer amfibieën op het menu; de totale opgestapelde prooivangst (dood of door beet verlamd) op een later tijdstip ophalend. Ook die verdwijning is waargenomen. En het zou zomaar kunnen dat beide daders met elkaar van doen hebben.

Het duingebied kent toename van recreatiedruk. Wordt dergelijke predatie in de vallei regel of blijft het uitzondering? Is de zeker geïdentificeerde bruine rat een blijvertje? En wat is reden voor het aantreffen en de doodsoorzaak van de huisspitsmuis? *Case not closed.*

Overigens is alle flora en fauna natuur. En die is niet hard, gemeen, maar is wat het is, zijn wie ze zijn. Eten en gegeten worden van ook (niet-) mede soortgenoten is de voedselkringloop, met de al dan niet bijbelse of Darwinistische oorsprong.

Ingrid den Boer

Blauwkleuring



Via de RAVON-helppesdek ontvingen we deze zomer veel foto's van dode hagedissen die blauwgekleurd waren. Dit fenomeen wordt vaker bij ons gemeld en betreft een lijkverkleuring die post mortem ontstaat.

Zo vonden Joop Verburg (linkerfoto) en Martin van Zandwijk (rechterfoto) eind juni in een natuurgebied vlak bij Zuidwolde een blauwgekleurde levendbarende hagedis.

