

- weer verdwenen.
2. Alle vastgestelde broedgevallen vonden plaats in de oude kernen van de beide dorpen, ook de rondvliegende vogels concentreerden zich boven deze kernen.
 3. De aantallen rondvliegende vogels nemen toe tot zij op ca 15 juli een hoogtepunt bereiken en hierna weer afnemen.
 4. De weersgesteldheid speelt bij de waarnemingen een grote rol, bij mooi weer met weinig wind zijn veel vogels in de lucht, bij winderig weer zakken de aantallen beduidend.

Verschillende jongelui hebben zich bijzonder goed van hun taak gekweten bij dit onderzoek. Een pluim op hun hoed is zeker op zijn plaats. Dit soort onderzoekjes, vooral over een aantal jaren, hebben bijzonder veel waarde bij het vaststellen van de verspreiding van de soort.

W.B.

VERSLAG UIT HET ASIEL.

Na het laatste overzicht op onze voorjaarsvergadering zijn nog bij mij binnengebracht o.a. 2 zee-koeten; 1 wijfje van de grote zaagbekeend; 1 grutto in overgangskleed.

Wat betreft de beide zeekoeten, deze waren enkele uren later reeds overleden. Het waren echter geen stookolieslachtoffers; waarschijnlijk hadden ze een of andere ziekte te pakken.

De grote zaagbekeend werd gevonden in de duinen nabij de Duindamse slag door één onzer jeugdleden. Bij onderzoek bleek dat er aan één van zijn vleugels was geknipt, waarschijnlijk heeft men hem ergens opgesloten gehad en hem gekortwiekt om het wegvliegen te beletten; hierin is men echter niet geslaagd.

Ik heb hem een nacht bij mij thuis gehouden om hem een beetje op zijn verhaal te laten komen. De volgende middag heb ik hem losgelaten in de Spoelsloot voor het huis van onze secretaris. Met goed gevolg, zodra hij in het water terecht kwam, dook hij diverse malen op de bekende manier onder. Toen ik tegen de avond nogmaals ging kijken was hij verdwenen.

De grutto die ik binnenkreeg was waarschijnlijk een vogel die met vergif in aanraking was geweest, hij was enkele uren later ook dood.

Mij is echter wel opgevallen, dat bij mij meerdere malen vogels zijn binnen gebracht met verlammingen aan het zogenaamde centrale zenuwstelsel, ik denk hierbij aan een zilvermeeuw en aan 2 kieviten. Deze vogels konden toen ze mij gebracht werden hun poten niet meer gebruiken en hun vleugels bewogen slecht. Bijna met zekerheid kan worden aangenomen dat deze vogels met landbouwvergif in aanraking zijn gekomen. Wat hiertegen te doen???

Door mij werd deze week op de Duinweg een van onze kleinere zangvogeltjes gevonden, dood, maar echter zonder verwondingen, wat volgens mij ook duidde, op landbouwvergif!

J. Hoek.

ALGEMENE WAARNEMINGEN.

Blok meldt een waarneming van een wouwaapje bij de Noordwijkerhoekbrug op 19 augustus, verder zag hij op 30 juli 3 groenpootruiters over zee trekken; op 6 augustus 6 kruisbekken in de zeereep en op 20 augustus 3 witgatjes bij een waterplas in het weiland benoorden het dorp.

Cramer zag op 6 mei een paartje grauwe vliegenvangers; op 13 juli 10 grote sterns boven zee en op 16 juli 1 sperwer op Landgoed Offem.

Glasbergen zag in 't duin een Europese kanarie en 2 grote bonte spechten op 15 juli; verder meldt hij op 13 mei 1 braamsluiper, 1 paar boomvalken en 12 overvliegende regenwulpen; op 3 juni 1 buizerd; op 10 juni 1 grote bonte specht.

Passchier zag op 17 juni 4 wulpen op Golfterrein; op 22 juli ontdekte hij een broedgeval van boerenzwaluw in een bunker op Golfterrein; hij vond het nest met 4 jongen; op 23 juli ± 20 trekkende visdieven over zee en in 't duin 1 draaihals en 1 sprinkhaanrietzanger.

Vink zag op 15 juni in de Wilhelminastraat 1 putter; op 16 juni trek van sterns en zwarte zeeëenden; 3 ♂♂ eidereenden en 1 bonte strandloper allen over zee; op 20 juni trek van spreeuwen en kieviten (spreeuwen in twee uur ± 2000 ex. en