



## De Strandloper

Contactorgaan van de  
Vereniging voor Vogel-  
bescherming noordwijk.

2<sup>e</sup> jaargang, nummer 3  
september 1970

---

Redactiecommissie : J.Vink, K.Verwey en J. van Dijk  
Redactieadres : Jozefde Veerstraat 42, Noordwijk  
Secretariaat : Sluispad 5, Noordwijk

---

### Bestuursmededelingen

#### Waarnemersvergadering:

De eerstvolgende bijeenkomst voor onze waarnemers vindt plaats op donderdag 10 september a.s. ten huize van D. Passchier, Egmonderstraat 45. Aanvang 8.00 uur n.m.

Het is niet onmogelijk dat deze Strandloper u pas na deze datum bereikt, maar de meeste waarnemers waren al met de datum bekend.

#### Herfstexcursie:

Zaterdag 19 september: K N A R D I J K, alleen voor leden.

Aanmelden voor 12 sept. bij D. Passchier, Egmonderstr.45, Noordwijk-B.  
Vertrek 6.00 u v.m. van de Punt, 6.10 u van het Lindenplein.

Kosten f 8;50 voor leden, f 5,- voor jeugdleden,

#### Filmavond:

Op vrijdagavond 9 oktober komt de bekende vogelfilmer Jo van Dijk met één van zijn fraaie kleurenfilms naar Noordwijk. Deze film zal ons een indruk geven van het vogelleven in de Zaanstreek.

De avond, die georganiseerd wordt samen met Vogellust, wordt gehouden in de grote zaal van De Rank aan de Golfbaan, aanvang 8.00 uur n.m.

Donateurs en Leden krijgen hun toegangsbewijs t.z.t. toegezonden.

Voor niet-leden zijn toegangsbewijzen a f 1,- verkrijgbaar bij:

Sigarenmag. Vink, Wilhelminastraat,

" " " Barnhoorn, Piet Heinstraat,

en 's avonds aan de zaal.

A.Cramer, secreteris.

### Het asiel in opspraak?

In het Vogeljaar, 18e jrg. nr. 2 wordt uitvoerig ingegaan op de massale sterfte van zeevogels in februari 1969 in het Waddengebied. De heren Spaans en Swennen besluiten hun artikel met een opsomming van alle problemen die zich voordoen bij reddingsacties voor met

olie besmeurde vogels. Het resultaat is vrijwel nihil, daar men een gezonde zeevogel al nauwelijks in leven kan houden. Zij adviseren dan ook bij grote rampen de slachtoffers maar uit hun lijden te verlossen. Met enkele vogels kan men dan nog wel eens proberen tot betere resultaten te komen.

Zo bleef er niet één vogel in leven van de ca 1000 dieren die op Texel en Terschelling waren ondergebracht.

Ook in ons asiel zijn de resultaten zeer bedroevend. Met olie besmeurde alken, zeeoeten, duikers en futen konden nooit worden losgelaten. Wel kreeg het Rijksmuseum in Leiden er een aantal schedels bij.

Gelukkig heeft het asiel meer betekenis voor twee andere groepen vogels, n.l. stormslachtoffers en vogels die op één of andere manier een ongeluk kregen.

Vooraf de eerste groep geeft de asielbeheerder af en toe veel voldoening. Zo konden er weer Jan van Genten, drieteenmeeuwen en een noordse stormvogel worden losgelaten.

Ook van de andere categorie zijn leuke voorbeelden te noemen: b.v. roerdomp en kerkuil.

Deze vogels zijn er het levende bewijs van dat het asiel wel degelijk een functie vervult. Zouden er alleen olieslachtoffers gebracht worden, dan zou de heer Hoek zich welhaast begrafenisondernemer voelen.

J. van. Dijk

-----

#### Voedselonderzoek bij de ransuil.

Bij de ransuil en ook bij de andere roofvogels worden de onverteerbare resten van hun prooidier in de vorm van een braakbal weer uitgebraakt. Ook kraaien, meeuwen en reigers doen dit.

Het is dus een, typisch vogelkenmerk, want bij zoogdieren is dit nooit geconstateerd.

In deze braakballen is van alles te vinden, zoals: botjes, haren, veren, tanden, nagels, dekschilden van kevers en zelfs een enkele keer vogelringetjes.

Aangezien ik weinig braakballen van de andere uilensoorten heb kunnen bemachtigen, houd ik me alleen bezig met de ransuil en wel over het jaar 1969, zowel zomer als winter.

Het afgelopen jaar heb ik ca 500 braakballen onderzocht. Bij elkaar zaten hier 923 prooidieren in.

Soms zitten er wel 5 schedelresten in één braakbal, een andere keer alleen maar haren en botjes zonder een enkel determinatiekenmerk.

Een vraag is of uilen bij grotere vogels de kop er maar afrukken en niet opeten.

Zo heb ik wel eens postduivenpoten gevonden maar nooit een kop.

In de 500 braakballen die ik onderzocht, heb ik de resten gevonden van 195 vogels, voornamelijk zaadeters zoals vinken, mussen, kneuen, groenlingen en enkele mezensoorten.

Verder resten van een jong konijn, 1 zwarte en 7 bruine ratten - waaronder ook jonge exemplaren -, 125 bosmuizen, 3 huismuizen, 18 dwergmuizen, 1 woelrat, 386 veldmuizen, 99 rosse woelmuizen, 2 aardmuizen, 6 noordse woelmuizen, 29 bosspitsmuizen en 18 kevers (voornamelijk mestkevers). Deze logge plompe kevers waren natuurlijk een gemakkelijke prooi.

Ook vond ik eens een hele dennenappel in een braakbal, waarschijnlijk