

zeer waarschijnlijk. Bij de kast met de dode koolmees, was 10 dagen later al een acht-tallig legsel aanwezig.

Dan nu het lijstje:

	aantal nesten	aantal eitjes	gemid- deld	pulli	gemid- deld
koolmees	13	111	8,5	97	7,5
pimpelmees	10	104	10,4	69	6,9
glanskopmees	1	9	9	8	8

Vorig jaar was het gemiddeld aantal eitjes voor kool- en pimpelmees respectievelijk 8,5 en 8, terwijl het gemiddeld aantal pulli 6,6 en 5,7 bedroeg.

Opmerkelijk was dat er ook dit jaar vrijwel geen tweede broedsels waren. Twee paren pimpelmezen begonnen eraan, maar gaven de moed na een rommelig nest en wat eitjes op.

Broedvogels Nieuw Leeuwenhorst 1970

Ook dit voorjaar werd weer een gedeelte van Nieuw Leeuwenhorst geïnventariseerd, n.l. het gedeelte dat begrensd wordt door Gooweg, Westeinde, het paadje ten noorden van de vijver en het asfaltwegje van het Parkhotel naar de Gooweg.

Op 8 excursies werden alle waargenomen vogels op een kaartje ingetekend. Alleen de vogels die steeds op dezelfde plaats werden waargenomen, zijn als broedvogel beschouwd. Natuurlijk werd niet van elk paar ook het nest gevonden, er werd ook niet naar gezocht. Andere lieden zochten kennelijk wel, want gemakkelijk te vinden nesten werden allemaal uitgehaald, o.m.: kauw, staartmees, roodborst, merel, houtduif.

Mijn bewering van vorig jaar dat de recreatie nauwelijks schadelijk is voor de broedvogelpopulatie, durf ik nu dan ook niet te herhalen.

Dan nu de lijst. Tussen haakjes staan de aantallen van vorig jaar vermeld.

merel	12 (14)	bosuil	1 (1)	grasmus	1 (2)
zanglijster	4 (4)	winterkoning	4 (6)	rietzanger	1 (2)
gr.lijster	1 (-)	tjiftjaf	5 (5)	bosrietzanger	1 (2)
huismus	2 (2)	koolmees	13 (11)	houtduif	10 (10)
roodborst	3 (5)	pimpelmees	10 (12)	tortel	5 (4)
nachtegaal	2 (4)	glanskop	2 (0)	turkse tortel	3 (1)
heggemus	3 (3)	staartmees	1 (0)	vink	1 (1)
spreeuw	12 (17)	fazant	1 (0)	wilde eend	4 (4)
zw.kraai	1 (1)	fitis	6 (11)	waterhoen	2 (2)
kauw	7 (11)	zwartkop	7 (8)	meerkoet	1 (1)
gaai	2 (2)	tuinfluiter	6 (6)	Gr.vliegenv.	1 (-)
gr.bo.specht	1 (1)				

Enkele malen in broedseizoenen gezien:

wielewaal	fluiter	torenvalk
spotvogel	vuurgoudhaantje	groene specht

Begin mei werd in het prikkeldraad langs de Gooweg een dode groene specht gevonden. Waarschijnlijk een vrouwtje, daar nog in de hele maand juni het gelach van een groene spechtman bleef te horen.

De fluiter bleef twee weken onafgebroken zingen en was duidelijk ongepaard.

De oppervlakte van het geïnventariseerde terrein bedraagt ca 23,5 ha.

J. van Dijk

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o