

INVENTARISATIE VAN HET LANDGOED "OFFEM" 1974

Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar "Offem" geïnventariseerd, waarbij niet alleen de fauna maar ook de flora de aandacht kreeg. Dat beide uniek zijn voor Noordwijk en omgeving blijkt wel uit de hieronder beschreven resultaten.

De fauna

De volgende vogels hebben er gebroed:

	<u>1974</u>	<u>1973</u>		<u>1974</u>	<u>1973</u>
Blauwe reiger	1	1	Kauw	15-20	12
Wilde eend	6	7	Ekster	2	2
Meerkoet	1	1	Vlaamse gaai	3	2
Waterhoen	4	2	Koolmees	10	4
Boomvalk	1	1	Pimpelmees	5	5
Torenvalk	1?	-	Staartmees	1	1
Bosuil	-	1	Glanskop	2	1
Houtduif	25-30	?	Winterkoning	15	12
Turkse tortel	6	7	Roodborst	12	8
Tortelduif	8	2	Merel	20	15
Koekoek	1	1	Zanglijster	8	6
Groene specht	1	1	Zwartkop	5	4
Grote bonte specht	1	1	Tuinfluiters	8	2
Boerenzwaluw	3	1	Spotvogel	1	1
Zwarte kraai	2	2	Fitis	10	6
Tjiftjaf	5	5	Boomkruiper	2	1
Vink	1	1	Grauwe vliegenvanger	2	-
Groenling	2	4	Spreeuw	20	15
Heggemus	7	4	IJsvogel	1?	-
Huismus	?	?	Fazant	2	-
Ringmus	5	?			

De Blauwe reiger en de Meerkoet blijken vorig jaar toch op "Offem" gebroed te hebben, hoewel dit vorig jaar bij het verslag niet vermeld is. Hoewel er in het voorjaar soms 11 Blauwe reigers te zien waren, bleef het ook dit jaar tot 1 paar beperkt, dat drie jongen grootbracht.

De Torenvalk werd gedurende het gehele broedseizoen bij een nestkast gezien. Van broeden kon echter niets geconstateerd worden.

De Bosuil heeft dit jaar niet gebroed. Het broedpaar verbleef gedurende de winter regelmatig op de hooizolder boven een paardestal. Om de muizen hier te bestrijden was gif gestrooid met als resultaat dat behalve de muizen ook een Bosuil aan vergiftiging bezweek. Het andere exemplaar werd later nog regelmatig gezien.

Verschillende soorten kleine zangertjes (Fitis, Tuinfluiters, Roodborst) zijn nogal in aantal toegenomen. Dit zal vooral te danken zijn aan de uitdunning van het bos dat dit jaar is uitgevoerd.

Van de Grauwe vliegenvanger werden in juli 2 paar met pas uitgevlogen jongen gezien. Vorig jaar lieten ze geheel verstek gaan.

De IJsvogels werden gedurende het gehele broedseizoen waargenomen; de eerste waarneming was op 31 maart. Op 18 mei werd bij toeval een nestgang in een steile kant van een nog geen één meter brede greppel gevonden. De vogels werden tot eind juli in de buurt van dit nest gezien, steeds echter maar 2 exemplaren. Eenmaal werd een vogel met voer in de bek gezien. Bij latere controle van het nest (augustus) werd behalve veel visgraten, ook een ei gevonden. Begin december waren er drie IJsvogels op "Offem" gezien. Er is dus tenminste sprake van een broedpoging en het is zeker niet uitgesloten dat deze toch succesvol is geweest. De vogels waren zeer schuw en voordat ze gezien werden lieten ze hun kenmerkende hoge alarmroep horen.

Hoewel de Boomvalk steeds als broedvogel van "Offem" vermeld wordt, broedt hij in werkelijkheid in de directe omgeving.

De waarde van het landgoed is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de omgeving die nog vrij ongerept is. De weilanden rond "Offem" bijvoorbeeld vormen een onmisbaar foerageergebied voor verschillende lijstersoorten en waterhoentjes.

Buiten de broedvogels werden de volgende soorten nog waargenomen:

Wintertaling	Goudhaantje
Slobeend	Bonte vliegenvanger
Oeverloper	Koperwiek
Kievit	Kramsvogel
Scholekster	Gierzwaluw
Buizerd	Keep
Wespendief	Sijs
Sperwer	Putter
Boomklever	Kneu
Houtsnip	

De flora

"Offem" vormt een belangrijke schakel in de reeks van landgoederen die aan de binnenduinrand gelegen zijn. Over het algemeen is het gebied vrij vochtig, wat zijn weerslag vindt in de vegetatie. Behalve inheemse houtige gewassen, komen er vrij veel "exoten" voor. Vooral oudere exemplaren zijn fraai ontwikkeld b.v. Taxus, Tulpenboom, Ginkgo en Moerascypres.

Er werden 117 soorten hogere kruidachtige gewassen gevonden. De inventarisatie is echter niet volledig, vooral wat de grassen betreft.

In het voorjaar zijn vooral de z.g. stinse-planten opvallend. Enkele hiervan zijn:

Bosanemoon	- Anemone nemorosa
Bieslook	- Allium schoenoprasum
Daslook	- Allium ursinum
Sneeuwkllokje	- Galanthus nivalis
Knikkende vogelmelk	- Ornithogalum nutans
Gewone vogelmelk	- Ornithogalum umbellatum
Boshyacinth	- Scilla non-scripta
Oosterse sterhyacinth	- Scilla siberica

Daslook, Gewone vogelmelk en Knikkende vogelmelk zijn sinds kort officieel beschermde planten. Vooral Daslook komt nog talrijk voor veelal in gezelschap van Groot hoefblad.

Behalve deze stinse-planten zijn de volgende soorten kenmerkend voor "Offem":

Voorjaarshelmbloem	- Corydalis solida
Rankende helmbloem	- Corydalis claviculata
Lelietje van dalen	- Convallaria majalis
Vingerhoedskruid	- Digitalis purpurea
Robertskruid	- Geranium robertianum
Penningkruid	- Lysimachia nummularia
Stekelvaren	- Polystichum spinulosum
Groot hoefblad	- Petasites hybridus
Stijve klaverzuring	- Oxalis stricta
Grootbloemmuur	- Stellaria holostea
Tijmbladereprijs	- Veronica serpyfolia
Klimopereprijs	- Veronica hederifolia
Engelwortel	- Angelica sylvestris
Bosandoorn	- Stachys sylvatica
Reuze zwenkgras	- Festuca gigantea

Het is de bedoeling dat in het a.s. seizoen de vegetatie uitgebreider zal worden onderzocht, waarbij dan de nadruk op de structuur zal komen te liggen en zo mogelijk een vegetatiekartering zal worden gemaakt.

Hopelijk zal deze inventarisatie ook al bij kunnen dragen tot een positieve beslissing omtrent de toekomst van het landgoed "Offem".