

- Zwarte roodstaart : In 1974 werden twee broedgevallen in het in aanbouw zijnde Duinpark vastgesteld. Het is niet waarschijnlijk dat de soort zich blijvend in het onderzochte gebied zal vestigen.
- Fluiter : De soort broedt zeer onregelmatig op verschillende plaatsen. Er komen echter vrijwel jaarlijks broedgevallen in het gebied voor.
- Goudhaantje : Van deze soort werd slechts één maal een broedgeval vastgesteld. Het is echter waarschijnlijk dat het Goudhaantje vrijwel jaarlijks tot broeden komt.
- Geelgors : Het is opmerkelijk dat de soort bijna niet voorkomt ten zuiden Van het dorp. Vrijwel alle broedgevallen zijn in het noordelijk gedeelte van het gebied te vinden.
- Putter : Deze soort heeft zich sinds 1962 in het gebied gevestigd en komt vooral in de omgeving van Sancta Maria tot broeden.

#### Slotopmerkingen

Uit de gevonden gegevens komt naar voren dat er in de omgeving van Noordwijk nog enkele rijke vogelgebieden te vinden zijn. Naast de duinen, een gebied met een eigensoortige vogelbevolking, zijn vooral de landgoederen voor de vogels van belang. "Offem" en "Leeuwenhorst" zijn gebieden die door ligging en betrekkelijke rust belangrijk zijn als broedterrein voor veel soorten.

De ten noorden en ten zuiden van het dorp gelegen stichtingen (Sancta Maria en Dr.W.v.d.Berghstichting) zijn wat minder van belang. De weilanden achter Sancta Maria echter bieden een goede broedgelegenheid voor veel weidevogels. Dit geldt ook voor de polder Hogeweg, die door de ligging vrijwel ongestoord is. Eén van de fraaiste stukken die het gebied nog rijk is, is de Bronsgeest. Het is zeer te betreuren dat het gebied door de aanleg van een autosnelweg in tweeën is gedeeld. Niettemin is het en dit geldt vooral voor het meest oostelijk gelegen stuk, nog een waardevol broed- en rustgebied.

Literatuur: Aartse.E. e.a. 1973 De Vogels van Noordwijk  
Avifauna van Nederland 1970  
v.Dijk,J. ongepl. De Engelse gele kwikstaart als broedvogel in Nederland.

W.Baalbergen

#### VOGELINVENTARISATIE VAN HET VINKEVELD

Van het voorjaar zijn wij begonnen met het inventariseren van "Het Vinkeveld". Dit gebied is gelegen ten zuiden van Noordwijk. Het bevat bouwland, bos en een randje duin.

Begin maart zijn we gestart en hoewel het in het begin nog wat moeilijk was, ging het later steeds beter. Gewoon even wennen dus.

We konden ons verheugen op een flink aantal broedvogels. De meeste soorten vonden we in de bosrand, die toch maar een zeer klein deel van het gehele gebied beslaat.

Winterkoning	7	Patrijs	2	Zwartkop	1
Koolmees	2	Ringmus	4	Koekoek	1
Veldleeuwerik	3	Fazant	1	Grasmus	1
Roodborst	2	Tjiftjaf	1	Scholekster	1
Spreeuw	2	Fitis	2	Witte kwikstaart	1
Ekster	1	Nachtegaal	2	Wilde eend	1
Merel	4	Tuinfluiter	1	Tortelduif	1
Kievit	1	Groenling	1	Houtduif en Turkse tortel ?	

Van één van de Patrijzen is het nest, dat toen 15 eieren bevatte, uitgehaald. Dit najaar hebben we toch weer een flinke koppel gezien. In het terrein is ook een torenvalkkast aanwezig. Hieruit hebben wen enkele malen een slapend exemplaar opgejaagd.

Van de Houtduif en de Turkse tortel is weinig bekend, omdat we hierop in het geheel niet gelet hebben.

Ook is er een paartje parende Pimpelmezen gezien. Dit was echter de enige waarneming en daarom is dit niet in de inventarisatielijst vermeld.

Cor van Duijn, Rob de Mooij,  
Rob Alkemade, Jos Alkemade en  
Peter Alkemade.

-----  
RANSUILEN IN "DE ZUID"

In het vorige winterhalfjaar hebben er aan de landkant een stuk of 7 Ransuilen gezeten, gedurende de maanden oktober, november, december 1973 en januari, februari en maart 1974.

Ze gebruikten de enkele dennen die daar tussen de loofbomen staan als dagverblijf. Dat was trouwens duidelijk te zien aan de met witte uitwerpselen bespetterde takken en grond. Op de helling, lekker uit de wind en ook heel weinig bezoekers die ze zouden opjagen.

De Ransuilen vielen daar dan ook niet op, vooral omdat ze buiten de broedtijd zwijgzaam zijn. Hun schutkleur en lichtschuwe leefwijze maken ze onopvallend. Als de uilen worden opgemerkt, dan hebben ze de bezoekers altijd al eerder gezien, wat ze tonen door het oprichten van de oorpluimpjes en het zich plat tegen de stam aandrukken.

Vorig jaar heb ik alle braakballen van deze Ransuilen verzameld. Ik hoop tenminste dat ik ze allemaal heb als andere mensen me niet voor geweest zijn. Gemiddeld produceert een uil een braakbal per dag. Dat zou dan in ± 180 dagen voor 5 à 7 uilen ten minste 1000 braakballen moeten zijn. Ik heb er in totaal maar 250 gevonden.

Nu is het mogelijk dat de uilen de braakballen ook op andere plaatsen tijdens hun nachtelijke vluchten uitspuwen of dat deze winter een magere winter voor de uilen is geweest.

Dat het geen goed muizenjaar is geweest, blijkt uit het lage percentage veldmuizen. Maar ander voedsel in de vorm van vogels is toch altijd wel voorhanden.

Hieronder volgt dan de lijst met alle prooidieren die door de uilen genuttigd zijn.

Huismussen	35	Heggemus	1
Vinken	9	Ondetermineerbare soorten	13
Lijsterachtigen	8	Veldmuizen	66
Leeuwerikken	7	Bosmuizen	93
Kneuen	7	Bosspitsmuizen	5
Ringmussen	7	Rosse woelmuizen	6
Roodborstjes	5	Dwergmuis	1
Spreeuwen	4	Dwergspitsmuis	1
Goudhaantjes	3	Huismuis	2
Koolmezen	2	Bruine rat	1
Groenlingen	2	Jong konijn	2
		Mestkever	1

Totaal 103 vogels  
177 zoogdieren  
280 prooidieren  
===