

AFDELING JEUGDWERK

NESTKASTONDERZOEK NIEW LEEUWENHORST.

Hoewel voor een gedegen nestkastonderzoek ten minste 3 controles vereist is, hebben we deze eis gelaten voor wat hij was. Immers, de jeugd van onze vereniging, pleegt elkaar op zaterdag eenmaal in de 14 dagen te ontmoeten en hoe op zaterdag zo'n onderzoek ook is, in het voorjaar is het aanbod van onderwerpen zo groot, dat 3 zaterdagen voor de nestkasten te veel van het goede zou zijn.

Maar ook de gegevens van 1 onderzoek verdienen meer dan zomaar in de doofpot gestopt te worden.

Bij het schoonmaken van de kasten in het vroege voorjaar, werd bij enkele kasten het vlieggat met een spijker afgesloten met de vrome wens, dat, wanneer deze kasten omstreeks 1 april (geen mop) geopend zouden worden, een Vliegenvanger of een Gekraagde roodstaart een kans zou krijgen hiervan gebruik te maken.

Helaas, alleen Kool- en Pimpelmezen hebben op dit moment gewacht. Maar wie weet volgend jaar misschien?

Van de 38 kasten waren er dit jaar 30 als broedplaats in gebruik genomen (vorig jaar 31) met het volgende resultaat:

Soort	aantal broedsels		aantaleieren		gem. per jaar	
	1976	1975	1976	1975	1976	1975
Koolmees	13	17	104	129	8,0	7,6
Pimpelmees	11	11	113	90	10,3	8,1
Glanskop	1	1	10	6	10,0	6,0
Spreeuw	-	-	-	5	-, -	5,0
Ringmus	6	2	28	10	4,6	5,0
TOTAAL	31	32	255	240		

Voor wie dit artikeltje goed gelezen heeft, blijft de vraag waarom het aantal bezette kasten (30) niet correspondeert met het aantal broedsels (31), terwijl de kasten maar eenmaal onderzocht werden.

Welnu, in 1975 had een Koolmeesvrouw het nodig gevonden haar eitjes op een eerder legsel van 9 stuks te leggen. En dit jaar werd in een kast een legsel aangetroffen bestaande uit 2 Koolmees- en 3 Ringmuseitjes. Alleen voor deze laatste kast zijn we nog eens terug geweest en toen bleek dat het Ringmussenlegsel met 2 eitjes was uitgebreid. Of dit legsel geheel werd uitgebreid, dus inclusief de 2 Koolmeeseitjes is jammer genoeg niet bekend.

Nemen we alle bewoners van onze kasten even op de korrel, dan blijkt, dat wat de Koolmees betreft er weinig veranderde, behoudens dat het aantal broedparen met 4 terugliep. De achteruitgang van de Koolmees kwam kennelijk de Ringmus weer ten goede. Deze soort ging met 4 paren vooruit. Het gemiddelde aantal eitjes per paar bleef voor beide soorten vrijwel constant.

Daarentegen steeg dit gemiddelde bij de Pimpelmees met 2,1 ei per nest, een voor mij onverklaarbaar verschijnsel.

De Glanskop heeft ons een tijdje in het onzekere gelaten. Misschien heeft 1 stel zich tevreden gesteld met een oud spechtegat.

Vier jaar geleden telden we nog 3 paar Spreeuwen in onze kasten en dit jaar geen, wat toe te schrijven is aan het regelmatig vervangen van oude kasten door nieuwe en gerepareerde kasten die ons door de heer van Dijk van het Zuid-Hollands Landschap beschikbaar worden gesteld.

Toch komt de Spreeuw in Nieuw Leeuwenhorst aan broedplaatsen niets te kort. Integendeel, bij tientallen maken ze gebruik van de vele boomgaten.



Pimpelmees

Al met al een positieve bijdrage van de jeugdclub tot een gezond vogelbestand in Nieuw-Leeuwenhorst.

Om dat ook voor 1977 te garanderen, zullen de eerste werkzaamheden (schoonmaken) in het nieuwe jaar op deze kasten gericht zijn, voordat de eerste mezen eind januari begin februari hun broedplaatsen gaan uitzoeken.

Is het dan een wonder dat de jeugdclub van het grootste deel van de in Nieuw Leeuwenhorst rondvliegende mezen het eigendomsrecht opeist?

D.Passchier

-----  
NIEUW-LEEUEWENHORST IN HET NAJAAR

Nieuw-Leeuwenhorst is een landgoed gelegen tussen het Westeinde en de Gooweg. Dit bos en het bos Oud-Leeuwenhorst, gelegen aan de oostkant van de Gooweg, is in het beheer van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Nu de vogels. In het najaar is Nieuw-Leeuwenhorst erg interessant voor de vogelliefhebber. De grote vijver, een overblijfsel van een tankval uit de tweede wereldoorlog trekt veel eenden aan. Ook de Dodaars wil er wel eens een enkele keer neerstrijken. In september werden de eerste wintergasten gezien; Wintertaling, Smient, Slobeend en de Fuut. De Fuut heeft in 1975 en 1976 met succes op de vijver gebroed. Beide keren werden drie jongen grootgebracht. Eén van de jongen bleef, nadat de ouders waren weggetrokken, nog geruime tijd op de plas. Ook werd eenmaal een mannetje Zomertaling gezien, toch wel een zeldzame gast in Leeuwenhorst.

In de rietkraag liet de Bosrietzanger zich nog enige keren in september horen. Oktober was de maand waarin het vinkenaantal explosief toenam. Na ongeveer een week was het aantal ruim 100 ex. waartussen ook verschillende keren Kepen werden ontdekt. Ook de mezen namen sterk toe. Tussen deze concentraties mezen vnl. Kool- en Pimpelmezen vond men ook Glanskopjes, Goudhaantjes, Boomkruipers en soms ook enkele Matkopjes, en een enkele keer de Zwarte mees.

In de heg vlak bij ingang Dijk en Burg verbleven al geruime tijd Groenlingen.

In november verschenen op de grote vijver nu ook de Kuifeenden. In het najaar 1975 was deze soort veel talrijker dan dit jaar. De Kuifeenden zijn waarschijnlijk door de vorstinval eind 1976 doorgetrokken. Ook werd in 1975 geruime tijd een vrouwtje Brilduiker op de plas gezien. In dezelfde periode als in 1975 werden nog 2 Grauwe vliegenvangers gezien.

In november en december verbleef er waarschijnlijk ook een Houtsnip in het bos, daar deze soort geregeld werd waargenomen in de jaren 1975 en 1976. De Pijlstaart is evenals het Nonnetje een zeldzame gast op de vijver. De laatste werd na een vorstperiode gezien. De IJsvogel, die met 2 ex. daar overzomerd heeft maar niet tot broeden gekomen is, werd in de jaren 1975 en 1976 tot eind januari gezien.

Een enkele keer werden er overvliegende Kolganzen gezien; 7 februari 1976 50 ex. noordwaarts, 20 december 1976 30 ex. zuidwaarts. Ook werden er twee keer Grauwe ganzen gezien n.l. op 20 en 22 december 1976 50 ex. zuidwaarts.

Een enkele keer werden er ook zeldzame vogels gezien. Draaihals 1 ex. van 11-17 mei 1975, Goudvink, 6 ex. 27 december 1976 en een Ruigpootbuizerd op 12 november 1975. Een van de twee buizerden die op Offem verbleef, werd in 1976 verscheidene malen boven het bos gezien. Torenavalken werden in alle seizoenen waargenomen maar Boomvalken echter zeer zelden. Een keer werd in de zomer van 1975 een zwakke Boomvalk gezien die nog maar pas was uitgevlogen. Een van de ouders bleef een tijdje boven het bos cirkelen en riep het jong. De juveniele valk werd later naar het asiel gebracht waar hij overleed.

Behalve bovengenoemde vogels zijn er nog vele andere te noemen, maar dit zou te veel zijn om op te noemen.

Arie Ruigrok