

BROEDVOGELINVENTARISATIE NOORDDUINEN IN 1978

Na een afwezigheid van 5 Jaren zijn we weer gaan inventariseren in de Noordduinen. We hebben het terrein zelfs met 3 kavels kunnen uitbreiden.

U vindt hieronder een tabel waarin van 1966-1972 de soorten zijn verzameld, alsmede van het afgelopen jaar 1978.

De soorten van de 3 nieuwe kavels zijn in een aparte lijst opgenomen.

	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>	<u>1978</u>
Wilde eend	-	3	1	2	1	2	5	11
Casarca	-	-	-	1	-	-	-	-
Kievit	3	4	3	2	2	2	1	5
Scholekster	-	-	-	-	-	-	-	2
Fazant	-	-	-	-	-	-	-	8
Patrijs	3	1	2	1	2	(1)	1	-
Houtduif	(22)	46	51	48	60	65	72	89
Tortelduif	3	6	5	5	7	10	10	19
Turkse tortel	5	4	3	8	6	6	8	5
Koekoek	-	(1)	(2)	(2)	(-)	(2)	2	5
Steenuil	-	-	-	-	-	1	1	-
Ransuil	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Groene specht	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1
Grote bonte specht	-	-	1	2	3	1	3	5
Torenvalk	-	-	-	-	-	-	-	1
Veldleeuwerik	9	35	33	32	33	34	48	38
Boomleeuwerik	1	3	1	1	2	3	2	6
Kuifleeuwerik	-	-	-	-	-	-	-	1
Boerenzwaluw	-	1	3	1	-	-	-	-
Boompieper	(19)	31	32	20	26	26	29	12
Graspieper	5	9	10	7	7	10	10	18
Witte kwikstaart	1	1	1	-	-	-	-	(1)
Grauwe klauwier	2	4	2	4	4	4	4	1
Winterkoning	10	16	18	17	12	17	17	28
Heggemus	(21)	38	45	36	35	28	42	40
Grote lijster	5	6	4	7	6	2	2	1
Zanglijster	(15)	25	27	27	23	15	22	8
Merel	(40)	67	67	73	68	61	79	39
Tapuit	16	13	25	22	23	24	26	19
Roodborsttapuit	3	5	6	7	6	4	9	8
Paapje	1	1	2	-	1	1	-	-
Gekraagde roodstaart	11	18	17	11	6	5	7	1
Nachtegaal	16	17	15	16	16	16	22	23
Roodborst	(4)	19	24	25	20	18	18	15
Sprinkhaanrietzanger	1	-	2	2	1	6	4	-
Spotvogel	-	1	-	1	-	1	-	2
Tuinfluit	5	5	6	4	2	3	3	2
Zwartkop	1	3	3	6	4	4	8	6
Grasmus	33	42	36	16	23	13	22	11
Braamsluiper	1	-	-	-	-	1	-	1
Fitls	49	71	52	63	59	48	68	63
Tjiftjaf	6	5	8	10	9	8	7	12
Fluiter	3	-	-	-	-	-	-	-
Goudhaantje	1	-	-	-	-	-	-	-
Grauwe vliegenvanger	2	2	3	3	1	-	1	2
Bonte vliegenvanger	-	-	1	-	-	-	-	-
Koolmees	6	7	9	16	17	18	18	17
Pimpelmees	1	1	1	-	1	2	-	7
Kuifmees	2	1	1	1	4	-	1	-
Staatmees	-	-	1	1	-	-	2	-
Boomkruiper	-	-	-	-	-	-	-	1
Geelgors	10	11	16	10	11	9	8	-
Vink	(2)	8	10	7	6	7	6	2

	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>	<u>1978</u>
Groenling	(4)	18	9	12	8	3	5	9
Putter	-	1	1	-	-	-	-	-
Kneu	(35)	84	67	64	60	65	76	59
Kruisbek	-	1	-	-	-	-	-	-
Huismus	6	15	24	1	6	7	13	53
Ringmus	13	4	16	9	5	8	8	12
Spreeuw	10	8	14	7	4	2	12	23
Ekster	2	2	2	4	1	2	3	7
Vlaamse gaai	-	2	1	1	2	3	4	7
Zwarte kraal	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Houtsnip	-	-	-	-	-	-	-	1

#### TOELICHTING

##### Kievit

Ondanks de voorspelde afname, blijkt er zelfs van een toename sprake te zijn.

##### Scholekster

Een nieuwe soort voor het gehele terrein.

##### Fazant

Deze soort werd vroeger nooit geteld, omdat het een uitgezette soort was. Aangezien de Fazant zich nu op een meer natuurlijke wijze kan aanpassen, omdat er geen kuikens meer worden uitgezet, is deze soort in 1978 geteld.

##### Patrijs

Het ziet er naar uit dat deze soort in de Noordduinen verdwenen is.

##### Houtduif

Deze soort neemt duidelijk toe.

##### Tortelduif

Het is een verheugend verschijnsel dat dit duifje weer in aantal toeneemt.

##### Koekoek

Met ons systeem van broedvogels vaststellen is het moeilijk de Koekoek als broedvogel te inventariseren.

##### Steenuil

Het Steenuiltje broedde in een schuurtje op de grens met het inventarisatiegebied.

##### Ransuil

Broedgeval niet waarschijnlijk. De Ransuilen werden solitair gezien.

##### Groene specht

We kunnen nu zeggen dat deze soort in de Noordduinen broedt omdat in het inventarisatiegebied jonge vogels zijn gesignaleerd.

##### Grote bonte specht

Deze soort gaat duidelijk vooruit.

##### Torenavalk

Broedgeval bij woning van Arno Bos aan de Duinweg.

#### Boomleeuwerik

Deze soort is duidelijk in aantal toegenomen.

#### Kuifleeuwerik

Hoewel de Kuifleeuwerik veel op de Trimbaan werd waargenomen is deze soort duidelijk een grensgeval. Vermoedelijk heeft de Kuifleeuwerik gebroed op het platte dak van Groot Hoogwaak.

#### Boerenzwaluw

Door het dichtmaken van de bunkers is het broedbiotoop voor de Boerenzwaluw verdwenen.

#### Boompieper

De Boompieper is duidelijk achteruit gegaan. Niet alleen in de Noordduinen maar ook in de AW-duinen.

#### Graspieper

Deze soort komt veel voor in de zeereep. Aantal stijgt langzaam.

#### Witte kwikstaart

Broedgeval niet zeker. De Witte kwikstaart werd 3x in het inventarisatiegebied gezien.

#### Grauwe klauwier

Deze soort gaat in West-Nederland sterk achteruit. Over een eventueel tweede broedpaar is geen zekerheid.

#### Winterkoning

Deze soort neemt duidelijk toe. Vermoedelijk zijn de broedbiotopen verbeterd door het verdwijnen van de dennen.

#### Grote lijster

Aantal neemt nog steeds af. De oorzaak is niet duidelijk.

#### Zanglijster

Een onverwachte afname maar we hopen niet definitief.

#### Merel

Eveneens als bij de Zanglijster is er ook een duidelijke afname te zien van de Merel. Oorzaak is niet duidelijk.

#### Tapuit

Een lichte afname.

#### Paapje

Het is vrijwel zeker dat het Paapje als broedvogel in de Noordduinen is verdwenen. Deze soort is ook in de AW-duinen hard achteruit gegaan.

#### Gekraagde roodstaart

De Gekraagde roodstaart zal wel als broedvogel uit de Noordduinen verdwijnen. Vermoedelijk wordt het te druk. In de AW-duinen kan deze soort zich aardig handhaven.

#### Nachtegaal

Het aantal neemt weliswaar langzaam toe.

### Sprinkhaanrietzanger

In 1978 is deze soort niet meer als broedvogel in de Noordduinen aangetroffen. We hopen echter dat dit een tijdelijk verschijnsel is. Ook in de AW-duinen is de Sprinkhaanrietzanger hard achteruit gegaan. Misschien dat de oorzaken van het verdwijnen van deze soort wel gezocht moeten worden in het overwinteringsgebied in Afrika.

### Grasmus

De dalende lijn zet zich nog steeds voort. De sterke teruggang in 1969 is vermoedelijk te wijten aan de droogte in de Sahellanden. De trekroute was voor de Grasmus langer geworden.

### Braamsluiper

Vermoedelijk zijn van deze soort meer broedparen in de Noordduinen dan uit de staat blijkt. De Braamsluiper is een erg moeilijke vogel om te inventariseren.

### Pimpelmees

Deze soort neemt duidelijk in aantal toe.

### Boomkruiper

De Boomkruiper is een nieuwe broedvogel in de Noordduinen.

### Geelgors

De Geelgors is als broedvogel uit de duinen verdwenen. Het is niet bekend wat de oorzaken zijn van dit verdwijnen.

### Vink

Ook de Vink neemt duidelijk in aantal af.

### Ekster

De Ekster en ook de Vlaamse Gaai zijn sterk in aantal vooruit gegaan. Dat is zeker geen toename die toe te juichen is. Beide soorten kunnen onder de zangvogels aardig huishouden.

### Zwarte kraai

Zwarte kraai wordt al jaren lang in de Noordduinen waargenomen. Het nest is nog nooit gevonden.

### Houtsnip

De Houtsnip is een nieuwe broedvogel in de Noordduinen.

	<u>kavel 6</u>	<u>kavel 7</u>	<u>kavel 8</u>	
Wilde eend	5	13	9	
Kievit	5	1	-	
Scholekster	2	1	-	
Wulp	1	1?	-	
Fazant	6	5	4	
Waterhoen	-	-	1	
Houtduif	40	25	22	
Tortelduif	5	2	15	
Turkse tortel	30	-	5	Het aantal in kavel 6 zal wel afnemen. In de omgeving van de voormalige camping werd een groot aantal broedparen geteld.

	<u>kavel 6</u>	<u>kavel 7</u>	<u>kavel 8</u>
Koekoek	-	1	-
Steenuil	-	-	1
Bosuil	-	-	1
Ransuil	1	2	2
Groene specht	-	-	1
Grote bonte specht	1	-	3
Veldleeuwerik	7	14	-
Boomleeuwerik	2	2	-
Boompieper	1	3	1
Graspieper	3	7	-
Witte kwikstaart	-	2	-
Winterkoning	5	11	7
Heggemus	4	13	3
Zanglijster	2	1	1
Merel	4	7	12
Tapuit	3	4	-
Roodborsttapuit	3	1	-
Gekraagde roodstaart	-	-	1
Nachtegaal	-	5	2
Roodborst	13	11	-
Spotvogel	-	-	1
Tuinfluitter	2	1	2
Zwartkop	2	-	1
Grasmus	1	5	-
Fitis	9	10	7
Tjiftjaf	4	1	5
Grauwe vliegenvanger	1	-	-
Koolmees	7	1	8
Pimpelmees	2	-	6
Staartmees	1?	-	-
Boomkruiper	4	1	2
Vink	6	2	3
Groenling	8	-	7
Kneu	6	20	2
Huismus	25	5	-
Ringmus	1	-	3
Spreeuw	13	2	-
Ekster	4	3	1
Vlaamse gaai	5	1	2
Houtsnip	-	1	1

Aan het onderzoek in 1918 werkten mee in volgorde van kavel:

kavel 1 : Marian Bos en Dick Hoek

kavel 2 : Rob Alkemade en Cor van Duijn

kavel 3 : Arie Cramer, Jan Glasbergen en Frank Duijvenvoorde

kavel 4 : Rob de Mooij en Mart Gielen

kavel 5 : Jelle van Dijk en Arie Ruigrok

kavel 6 : Willem van der Niet

kavel 7 : Henk van Duijn en Hein Verkade

kavel 8 : Arno Bos en Dick Passchier

De kavels 4 en 8 zijn onvolledig onderzocht.

We hopen in 1979 het totale terrein weer op broedvogels te kunnen onderzoeken, zodat dan wat beter op de resultaten kunnen worden ingegaan.

A.Cramer

-----