

opmerkingen:

Houtsnip: 1 paar broedde vermoedelijk in de A.W.duinen.

Tortelduif: op 27 mei 1 ex.

Koekoek: grensgevallen met de A.W.duinen.

Groene specht: één paartje in het gebied en één waarschijnlijk net over de "grens".

Gekraagde Roodstaart: dit paar huisde in hoog Populierenbos.

Wielewaal: zingend op 20 en 27 mei.

Ekster: veel meer nesten dan broedparen aanwezig!

Kneu: vermoedelijk net over de grens broedend.

-----

<u>Broedvogeltelling Noordduinen 1980 kavel I t-m V.</u>	inventariseerders:
(Noordduinen tot de Duindamse Slag	kavel I D.Hoek en M. Bos
Zie kaartje elders in dit nummer)	kavel II F.v.Duyenuoorde
	kavel III J.Glasbergen
	kavel IV A.Ruygrok
	kavel V A. en W. Cramer

### Inleiding

Evenals in het voorgaande jaar is in 1980 het bovengenoemd gebied geïnventariseerd. Wie aandachtig de lijst van de broedvogels bekijkt, ziet dat verschillende soorten in aantal afnemen of geheel verdwijnen en dat andere soorten zich goed handhaven. Ook hebben enige soorten zich voor het eerst in dit gebied gevestigd. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er een zekere "vervlakking" in het aantal voorkomende soorten valt waar te nemen. Een voor de hand liggende oorzaak zou de sterke recreatiedruk kunnen zijn, maar na een gesprek met Dick Hoek hierover ben ik me er van bewust geworden dat ook nog andere factoren een rol spelen bij het veranderen van het vogelbestand in dit terrein..

De veranderingen die in het terrein hebben plaats gevonden, zoals het steeds verder wegvallen van de dennenbegroeiing en het veelvuldig aanplanten van struikgewas zullen zeker van invloed zijn op de vogelstand. Het is moeilijk een duidelijke conclusie te trekken, na afwegen van de mogelijke oorzaken en het betrekken van landelijke tendensen in onze overwegingen.

Met zekerheid kan mijns inziens gesteld worden dat het terrein sinds 1966 een steeds toenemend aantal bezoekers heeft gekend. Dat heb ik in ieder geval in al die jaren dat er nu geïnventariseerd wordt, wel kunnen constateren.

Nu volgt de lijst met de cijfers, daarna kan op een enkele soort nog wat nader worden ingegaan:

soort	'72	'78	'79	'80	soort	'72	'78	'79	'80
Wilde eend	5	11	9	5	Nachtegaal	22	23	19	20
Kievit	1	5	(2)	2	Sprinkhaanrietzanger	4	-	-	(1)
Scholekster	-	2	-	-	Spotvogel	-	2	3	4
Fazant	-	8	11	9	Tuinfluiter	3	2	4	3
Patrijs	1	-	(1)	(2)	Zwartkop	8	6	6	5
Houtduif	72	89	75	62	Grasmus	22	11	10	18
Tortelduif	10	19	9	15	Braamsluiper	-	1	(1)	1
Turkse tortel	8	5	12	8	Fitis	68	63	59	58
Koekoek	2	(5)	(3)	(5)	Tjiftjaf	7	12	10	13
Stenuil	1	-	-	-	Fluiter	-	-	(1)	-
Ransuil	-	(2)	-	-	Grauwe vliegenvanger	1	2	1	-
Groene specht	(1)	1	1	(2)	Koolmees	18	17	18	18
Grote bonte specht	3	5	4	3	Pimpelmees	-	7	3	3
Torenvalk	-	1	-	1	Kuifmees	1	-	1	-

vervolg lijst noordduinen kavel I t/m V.

soort	'72	'78	'79	'80	soort	'72	'78	'79	'80
Veldleeuwerik	48	38	26	31	Staartmees	2	-	-	-
Boomleeuwerik	2	6	3	3	Boomkruiper	-	1	1	2
Kuifleeuwerik	-	1	1	1	Geelgors	8	-	-	-
Boompieper	29	12	14	8	Vink	6	2	(3)	2
Graspieper	10	18	13	15	Glanskopmees	-	-	1	(2)
Witte kwikstaart	-	(1)	-	-	Groenling	5	9	4	(5)
Grauwe klauwier	4	1	-	-	Putter	-	-	(1)	-
Winterkoning	17	28	9	14	Kneu	76	59	(50)	51
Heggemus	42	40	33	27	Huismus	13	53	60	46
Grote lijster	2	1	2	3	Ringmus	8	12	8	10
Zanglijster	22	8	7	6	Spreeuw	12	23	17	28
Merel	79	39	32	33	Ekster	3	7	11	9
Tapuit	26	19	14	30	Vlaamse gaai	4	7	9	7
Roodborsttapuit	9	8	(6)	(7)	Zwarte kraai	-	(2)	(2)	2
Paapje	-	-	(1)	-	Houtsnip	-	1	(1)	-
Gekraagde roodstaart	7	1	1	-	Wulp	-	-	(2)	1
roodborst	18	15	17	17					

Opmerkingen:

Zie voor nadere gegevens over voorgaande jaren Strandloper 11e jaargang, nr.1.

Fazant: toch nog 9 broedparen, ondanks het feit dat er geen jonge Fazanten worden uitgezet, zoals vroeger wel gebeurde. Wel wordt er nog regelmatig gevoerd!

Patrijs: één, mogelijk 2 broedgevallen en dit ondanks de "vossenplaag"?

Torenvalk: wel regelmatig aanwezig in kavel 1 en in de zeereep van kavel 3 en 5.

Steenuil en Ransuil zijn uit het gebied verdwenen.

Groene specht: vermoedelijk 2 broedgevallen. Van 1966 tot 1971 kwam deze soort hier niet voor als broedvogel.

Grote bonte specht: is weer terug op het aantal van 1972.

Boompieper: een duidelijke afname; in 1972 29 paar, in 1980 nog maar 8 paar.

Grauwe klauwier: 1 ex, waargenomen in kavel 3. Heeft niet meer gebroed.

Zanglijster: sterke teruggang van 22 paar in '72 naar 6 paar in 1980.

Tapuit: Van 14 paar in '79 naar 30 paar in '80. In de voorgaande inventarisatie periode was het hoogste aantal 26 paar in het jaar 1972.

Paapje en Gekraagde Roodstaart zijn niet meer als broedvogel in onze duinen te vinden, de Sprinkhaanrietzanger lijkt ook te verdwijnen.

Braamsluiper: broedgeval in kavel 5.

Tjiftjaf: neemt geleidelijk toe, mogelijk door het hoger wordend geboomte aan de duinvoet?

Glanskopmees: in kavel 1 zit een gedeeltelijke albino glanskop met wit i.p.v. zwart petje.

verslag van A.Cramer

-----

Verslag broedvogelinventarisatie Noordduinen ten noorden van de Duindamse Slag 1980.

Inventariseerders:  
 H.v.d.Niet  
 C.Verweij  
 H.v.Duijn  
 H.Verkade  
 A.Bos

Voor het derde jaar werd dit gebied geïnventariseerd. Schreven wij vorig jaar dat er, ten aanzien van de recreatiedruk een verschil viel te constateren tussen het gebied ten zuiden en het gebied ten noorden van de Duindamse Slag, dan laten we nu een ander geluid horen.

Zeker het oostelijk deel van het terrein, dat met dennen begroeid is, kent een zeer hoog aantal bezoekers.

Het zal voor de fauna van het terrein zeer gunstig zijn, dat er 2 rustgebieden in voorkomen, n.l. het terrein rond het meertje (voor publiek gesloten) en het terrein van de Golfbanen (voor een beperkt aantal mensen toegankelijk). Mogelijk zou er in het gebied ten zuiden van de Duindamse slag ook nog het één en ander bereikt kunnen worden met het creëren van rustgebieden. Soorten als Ransuil, Bosuil en Steenuil komen in de kavels 6,7, en 8 gelukkig nog voor.

Hieronder volgt de lijst met gegevens. Tellingen werden verricht van begin maart tot half juli.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de kavelgegevens voor deze tabel Bij elkaar opgeteld.

soort	'78	'79	'80	soort	'78	'79	'80
Wilde eend	27	22	(18)	Spotvogel	1	1	-
Fazant	14	13	9	Tuinfluiter	5	4	1
Patrijs	-	(1)	2	Zwartkop	3	4	3
Kievit	6	4	3	Grasmus	6	6	6
Scholekster	3	3	2	Fitis	26	38	36
Wulp	2	(3)	2	Tjiftjaf	10	9	17
Houtduif	87	60	(60)	Grauwe vliegenvanger	1	1	-
Tortelduif	22	8	7	Koolmees	16	23	28
Turkse tortel	25	11	9	Pimpelmees	8	4	(5)
Koekoek	1	4	2	Staartmees	1	-	-
Ransuil	2	(4)	4	Kuifmees	-	(2)	(3)
Bosuil	1	1	1	Glanskopmees	-	1	-
Steenuil	-	-	-	Boomkruiper	7	6	3
Groene specht	1	(4)	4	Vink	11	6	(4)
Grote bonte specht	4	4	5	Groenling	15	4	9
Veldleeuwerik	21	18	17	Kneu	28	21	18
Boomleeuwerik	4	2	1	Huismus	30	24	(26)
Boompieper	5	5	6	Ringmus	4	10	7
Graspieper	10	13	14	Spreeuw	15	11	(12)
Witte kwikstaart	1	2	1	Ekster	8	10	7
Winterkoning	23	8	15	Vlaamse gaai	8	6	9
Heggemus	20	17	20	Houtsnip	2	-	-
Zanglijster	4	8	4	Zwarte kraai	-	1	1
Merel	23	20	21	Kauw	-	(1)	-
Grote lijster	-	(3)	1	Putter	-	(1)	-
Tapuit	7	9	(9)	Bosrietzanger	-	(1)	-
Roodborsttapuit	4	9	5	Sprinkhaanrietzanger	-	(1)	-
Gekraagde roodstaart	1	(2)	(1)	Grauwe klauwier	-	1	1
Nachtegaal	7	5	7	Goudhaantje	-	-	(1)
Roodborst	24	18	10				

samensteller: A.Cramer