

Grote verschillen met voorgaande jaren zijn er niet, maar het volgende moet toch vermeld worden.

Roodborst en Winterkoning zijn weer terug op hun aantal van 1978, voor de strenge winter '78/79.

Evenals in het gebied ten zuiden van de Duindamse slag - waar de soort geheel ontbrak-, werd ook in het gebied ten noorden van de Duindamse slag het broeden van de Kievit niet met zekerheid vastgesteld.

De Grauwe klauwier is gelukkig nog steeds present in kavel 7. Helaas is dit wel het enig overgebleven broedpaar in ons gebied.

De Bosuil, Steenuil en ook de Ransuil komen in dit gedeelte nog steeds voor. De tellingen vonden plaats van begin maart tot half juni.

Dan nu de lijst, waarin alles op een rijtje gezet wordt:

soort	'78	'79	'80	'81	soort	'78	'79	'80	'81
Wilde eend	27	22	(18)	17	Spotvogel	1	1	-	-
Fazant	14	13	9	12	Tuinfluiter	5	4	1	1
Patrijs	-	(1)	1	(2)	Zwartkop	3	4	3	6
Kievit	6	4	3	(1)	Grasmus	6	6	6	8
Scholekster	3	3	2	1	Fitis	26	30	36	39
Wulp	2	(3)	2	(3)	Tjiftjaf	10	9	17	13
Houtduif	37	60	(60)	(50)	Grauwe vliegenvanger	1	1	-	-
Tortelduif	22	8	7	9	Koolmees	16	23	23	32
Turkse tortel	25	11	9	12	Pimpelmees	8	4	5	7
Koekoek	1	4	2	(3)	Staartmees	1	-	-	(1)
Ransuil	2	(4)	4	3	Kuifmees	-	(2)	(3)	1
Bosuil	1	1	1	1	Glanskopmees	-	1	-	-
Steenuil	-	-	-	(1)	Boomkruiper	7	6	3	5
Groene specht	1	(4)	4	4	Vink	11	6	(4)	6
Grote bonte specht	4	4	5	4	Groenling	15	4	9	9
Veldleeuwerik	21	16	17	17	Kneu	20	21	18	(16)
Boomleeuwerik	4	2	1	(2)	Huismus	30	24	(26)	(20)
Boompieper	5	5	6	5	Ringmus	4	10	7	4
Graspieper	10	13	14	15	Spreeuw	15	11	12	11
Witte kwikstaart	1	2	1	1	Ekster	2	10	7	12
Winterkoning	23	8	15	22	Vlaamse gaai	8	6	9	11
Heggemus	20	17	20	21	Houtsnip	2	-	-	1
Zanglijster	4	8	4	5	Zwarte kraai	-	1	1	1
Grote lijster	-	(3)	1	1	Kauw	-	(1)	-	-
Tapuit	7	9	(9)	10	Putter	-	(1)	-	-
Roodborsttapuit	4	9	5	3	Bosrietzanger	-	(1)	-	-
Gekraagde Roodstaart	1	(2)	(1)	-	Sprinkhaanrietzanger	-	(1)	-	-
Nachtegaal	7	5	7	8	Grauwe klauwier	-	(1)	1	-
Roodborst	24	18	10	23	Goudhaantje	-	-	(1)	-
Merel	23	20	21	27					

samensteller van dit en het vorige verslag: Arie Cramer

Broedvogelinventarisatie 1981 in het Langeveld.

Zie eventueel het kaartje op bladzijde 30.

Inventariseerders: Jelle van Dijk, Benno Heethuis.

De meeste wijzigingen vergeleken met het vorige broedseizoen zijn veroorzaakt door meer of minder intensief bezoek en door de verdeling van deze bezoeken over de dag.

Zo is het grotere aantal Roodborsten ongetwijfeld tot stand gekomen dankzij een paar avondronden, waarop de soort veel werd gehoord.

De beide bezoeken in juni zijn vermoedelijk de oorzaak van hogere aantallen bij Tortelduif en Tuinfluiter. Ook de Grasmus werd pas in juni opgemerkt.

De hier aangegeven getallen suggereren een vrij grote nauwkeurigheid. Dit is maar schijn, want het aantal bezoeken in een dergelijk dicht bebost gebied is eigenlijk te gering.

Het gebied is bezocht van 11 april tot 12 juni, in totaal 5 keer.

De belangrijkste broedvogelsoorten uit dit kavel zijn ongetwijfeld de Glanskop, de Nachtegaal en de Geelgors. Deze laatste soort zong op drie plaatsen langs de Vogelaarsdreef. Vermoedelijk heeft 1 paar langs de bosrand gebroed.

soort	1980	1981	soort	1980	1981
Fazant	2- 3	1- 2	Braamsluiper	-	1- 2
Houtsnip	1- 2	1- 2	Bosrietzanger	-	0- 1
Houtduif	12-15	12-18	Sprinkhaanrietzanger	-	1
Tortelduif	0- 1	5	Tjiftjaf	5	4
Koekoek	1- 2	1- 2	Fitis	32-38	33
Groene specht	1- 2	1- 2	Staartmees	1	0- 1
Grote bonte specht	1	1	Glanskop	1	1- 2
Veldleeuwerik	1	-	Pimpelmees	4- 5	12
Boompieper	1- 2	2	Koolmees	7- 9	10
Witte kwikstaart	2	1	Zwarte kraai	0- 1	-
Winterkoning	8-10	13	Kauw	-	2
Heggemus	3- 4	3	Vlaamse gaai	4- 5	5
Roodborst	12-14	20	Ekster	5- 6	5
Nachtegaal	12-13	11-13	Spreeuw	8- 9	8-10
Gekraagde roodstaart	1	1- 2	Huisemus	8- 9	10-12
Merel	8-10	12	Ringmus	6	8-10
Zanglijster	2	5	Groenling	1	-
Tuinfluiter	1- 2	2	Kneu	0- 1	0- 1
Zwartkop	7-10	8	Geelgors	0	1- 3
Grasmus	-	1			

Vermoedelijk zit er één paar Bosuilen in de schuur bij Mevr. Koomen.

Voor de vergelijking van dit gebied met de gegevens van IJzendoorn (voor zover een redelijke vergelijking mogelijk is, zie het verslag van de A.W.-duinen hierna.

Jelle van Dijk

Broedvogelinventarisatie A.W.-duinen in 1981

Voor de vierde achtereenvolgende keer zijn door ons inventarisaties verricht naar het voorkomen van broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In het afgelopen jaar 1981 is daarbij het laatste stuk van het Zuid-Hollandse deel van het terrein onderzocht. Zie hiervoor het kaartje op bladzijde 35.

De inventarisaties werden uitgevoerd volgens de methode zoals omschreven in de "Handleiding voor Broedvogelinventarisatie", uitgave KNNV. Zonodig is deze handleiding voor onze inventarisaties enigszins aangepast. Het terrein werd hiertoe gedurende het broedseizoen tenminste éénmaal per week bezocht.