

Voor de Tuinfluiter en de Zwartkop geldt dat beide soorten achteruitgingen. De vermindering van vooral hogere bomen (berken) kan hiervan een oorzaak zijn

Ook de Grasmus verminderde in aantal. In de duinen ten noorden van Noordwijk was dit in de zelfde periode ook het geval. Landelijk viel de terugslag van de Grasmus tussen de jaren 1968 en 1975, waarna weer enig herstel intrad. In hoeverre dat ook voor het door ons onderzochte gebied op gaat, is met deze gegevens niet te zeggen.

De Braamsluiper is sterk toegenomen. Ook "Randstad en Broedvogels" spreekt van een aanzienlijke vooruitgang in de duingebieden. Overigens blijft de de Braamsluiper een lastig te inventariseren vogel.

De Koolmees vertoont een sterke vooruitgang, ook de Pimpelmees en de Staartmees namen, zij het wat minder, toe. De mezen profiteren waarschijnlijk van de vele dode en stervende bomen in het gebied.

De Vink liep terug van 54 paar in '73 tot 10 paar in '78/81. Eenzelfde beeld vinden we in de duinen ten noorden van Noordwijk. Het wegvallen van hogere bomen speelt in beide duingebieden misschien een rol.

Het aantal broedgevallen van de Ekster nam beduidend toe. Eenzelfde ontwikkeling vinden we in de duinen ten noorden van Noordwijk en in andere duingebieden.

Voor de Vlaamse gaai geldt eigenlijk hetzelfde. In de duinen van Noordwijk was de toename alleen wat geringer als in de A.W.-duinen.

Tot zover een aantal gegevens uit het uitstekende verslag van de Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Voor wie er nog meer van wil weten, of het hele verslag graag wil lezen: de samenstellers van dit verslag zijn gaarne bereid verdere inlichtingen te geven.

de samenstellers:
E.Aartse en
W.Baalbergen.

Nestkastenonderzoek in Nieuw-Leeuwenhorst 1981

Bij het verschijnen van deze strandloper zit de schoonmaak er voor de jeugdclub al weer op. Elk jaar start de Jeugdclub haar werkzaamheden n.l. met de reeds traditioneel geworden schoonmaakronde langs alle nestkasten.

Uit de kasten wordt dan alles verwijderd wat in het jaar daarvoor met zoveel liefde en toewijding naar binnen is gesleept. Dit is meteen een mooie gelogenheid om eens te kijken hoe een vogel zijn nest heeft opgebouwd. De mezen zijn ware bouwers, die niet gauw van de voor hen gebruikelijke methode afstappen.

Onderaan vinden we een dikke laag mos, daarboven overgaand in een laag van fijne haartjes, kunstig in elkaar geweven. Deze tweede laag vormt gelijk de bodem van het nest. Om die kom heen vinden we de rand, opgebouwd uit wat groffer materiaal als touwtjes, grashalmen en veertjes. De Ringmussen gebruiken vrijwel alleen haartjes en veertjes voor het nest, wat ze bovendien van een dak voorzien.

De Boomklever was nu voor het eerst in het ruim tienjarig bestaan van onze vogelkraamzorg, onze gast. Terecht grote vreugde en gepaste trots bij de Jeugdclub!


In de Kleverkast was alleen een dikke laag beukenbladeren verzameld.

Op de volgende pagina treft u tenslotte een overzicht aan van de telresultaten van het afgelopen jaar.

Aantal kasten	38
Aantal gebruikte kasten	31
Aantal lege kasten	5
Aantal kasten met alleen nestmateriaal	2

Er broedde 5 vogelsoorten die als volgt over de kasten verdeeld waren:

Soort	Aantal Paren	Aantal eitjes	Aantal Jongen	Gemiddeld Per/paar
Koolmees	8	63	--	bijna 8
Pimpelmees	11	84	14	bijna 9
Ringmus	10	39	--	bijna 4
Spreeuw	1	--	3	3
Boomklever	1	8	--	8
totaal	31	194	17	



Bovendien werden er weer de haast gebruikelijke "dwaaleitjes" van mezen in een Ringmussenest teruggevonden. Of deze drie eitjes ook door de Ringmus zijn uitgebroed, is niet bekend.

Dick Passchier

BROEDVOGELINVENTARISATIE OP HET LANDGOED "OFFEM"

Zoals ook in voorgaande jaren heeft er gedurende het voorjaar en het begin van de zomer in 1981 een inventarisatie naar broedvogels plaatsgevonden op het landgoed "Offem", direct ten oosten grenzend aan Noordwijk Binnen. De resultaten van deze inventarisatie luiden als volgt:

Soort	1980	1981	Soort	1980	1981
Blauwe reiger	26	+ 20	Huisemus	+ 15	+ 15
Wilde eend	+ 10	+ 10	Ringmus	?	?
Waterhoen	5	7	Koolmees	17	19
Torenvalk	1	1	Pimpelmees	6	6
Bosuil	?	?	Glanskopmees	-	1
Boomvalk	1	?	Staartmees	?	2
Houtduif	25-35	25-35	Merel	16	15
Tortelduif	2	2	Zanglijster	8	7
Koekoek	1	2	Spreeuw	25-30	25-30
Groene specht	3	1	Grauwe vliegenvanger	1	1
Grote bonte specht	2	4	Fazant	1	2
Boomkruiper	-	3	Zwarte kraai	2	4
Boerenzwaluw	11	?	Kauw	+ 20	+ 20
Tjiftjaf	8	13	Ekster	3	4
Fitis	8	10	Vlaamse gaai	2	4
Zwartkop	3	6	Turkse tortel	5	4
Tuinfluitier	10	3	Scholekster	-	1
Winterkoning	20	15	Slobeend	1	-
Roodborst	8	16			
Heggemus	1	4			
Groenling	4	?			
Spotvogel	1	2			