

Ook het aantal Spreeuwen-paren ligt ongetwijfeld hoger. Niet alle broedholten van vorig jaar konden geïnspecteerd worden. Vermeldenswaard zijn verder de waarnemingen van zingende Braamsluiers. Een exemplaar werd tweemaal gehoord.

Dit jaar werd ook door personen van een vogelwerkgroep (waarschijnlijk de Vogelwerkgroep Berkheide- red.) geteld. We hebben onze resultaten vergeleken en merkten dat hun uitkomsten aanmerkelijk hoger uitkwamen dan de mijne.

Zij hebben, in een door mij verwaarloosd deel van het gebied, een broedsel van een Patrijs gevonden. Ook hebben zij verschillende malen een zingende Spotvogel gehoord.

P.Imthorn

GOLFBADVERSLAG 1983.

De vegetatie van het voormalige Golfbadterrein in de Noordduinen in 1983.

Het afgelopen jaar werden door de gemeente Noordwijk plannen ontwikkeld om direct ten noorden van het voormalige golfbadterrein een strandslag aan te leggen ten behoeve van het vervoer van boten van leden van de Noordwijkse Sportvissersvereniging.

Hoewel de slag niet direct door het terrein van de kunstmatige vallei is gepland, valt te vrezen dat de slag een belangrijke negatieve invloed zal hebben op de natuurwaarden in de omgeving van de vallei. Het grootste deel van de groeiplaats van Blauwe bremraap en Bitterkruidbremraap zal verdwijnen, evenals de daar broedende Graspiepers en Roodborsttapuit.

Gelukkig wijzen de jongste ontwikkelingen erop, dat Burgemeester en Wethouders van Noordwijk uiteindelijk toch een andere, veel minder schadelijke oplossing zullen voorstellen.

(dit is inmiddels inderdaad gebeurd; al heeft deze oplossing het voorlopige karakter van een proef voor een half jaar.-Red.)

Aan het beheer werden het afgelopen jaar ook weer de nodige uren besteed. In het voorjaar werden enkele vierkante meters afgeplagd met het doel de beoogde verschraling van de bodem te versnellen. In het najaar werd de vegetatie gemaaid en het maaisel afgevoerd. Door het natte voorjaar stond nog tot in juni het water plaatselijk boven het maaiveld.

Het onderzoek naar de ontwikkeling van de vegetatie werd voortgezet. Ook dit jaar werden weer drie opnamen gemaakt. Er werden twee nieuwe soorten freatofyten (plantensoorten, die gebonden zijn aan de invloed sfeer van het grondwater) gevonden: Platte bies en Kruiwend struisgras.

De eerste soort is karakteristiek voor een vochtige, voedselrijke, vaak betreden bodem. De tweede soort is juist gebonden aan een vochtige, minder voedselrijke en kalkarme bodem.

Ook voor wat betreft de overige soorten is de richting, die de vegetatie opgaat, niet duidelijk. De kleine vallei (ca 500m²) herbergde in 1983 61 soorten hogere planten.

Het onderzoek zal in 1984 worden voortgezet.

Op de volgende bladzijde treft u een lijst aan van de freatofyten die tot nu toe zijn gevonden.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de tot nu toe aangetroffen freatofyten in de kunstmatige vallei.

jaar waarin de soort is aangetroffen (x):		75	76	79	80	81	82	83
Platte rus	(<i>Juncus compressus</i>)	-	-	-	-	-	-	x
Kruipend struisgras	(<i>Agrostis oanina</i>)	-	-	-	-	-	-	x
Watermunt	(<i>Mentha aquatica</i>)	-	-	-	-	-	x	x
Kruipwilg	(<i>Salix repens</i>)	-	-	-	x	x	x	x
Veenwortel	(<i>Polygonum amphibium</i>)	-	-	-	x	x	x	x
Mannagras	(<i>Glyceria fluitans</i>)	-	-	-	x	x	x	x
Zomprus	(<i>Juncus articulatus</i>)	-	-	x	x	x	x	x
Zilte zegge	(<i>Carex distans</i> var. vikingensis)	-	-	x	x	x	x	x
Grote lisdodde	(<i>Typha latifolia</i>)	-	-	x	x	x	x	x
Greppelrus	(<i>Juncus buffonius</i>)	x	x	x	x	x	x	x
Echte witbol	(<i>Holcus lanatus</i>)	x	x	x	x	x	x	x
Riet	(<i>Phragmites australis</i>)	?	?	x	x	x	x	x
Padderus	(<i>Juncus subnodulosus</i>)	-	x	x	x	x	x	x
Kleinbloemige basterd- wederik	(<i>Epilobium parviflorum</i>)	x	x	x	x	x	-	x
Harig wilgeroosje	(<i>Epilobium hirsutum</i>)	-	-	-	x	-	x	x
Gewone waterbies	(<i>Eleocharis palustris</i>)	x	x	-	-	x	x	-
Moerasdroogbloem	(<i>Gnaphalium uliginosum</i>)	-	x	x	x	-	-	-
Akkerkers	(<i>Rorippa sylvestris</i>)	x	-	-	x	-	-	-
Moeraskers	(<i>Rorippa Islandica</i>)	-	-	?	x	-	-	-
Zompvergeet-mij-nietje	(<i>Myosotis laxa</i>)	-	x	-	-	-	-	-
Kleine waterweegbree	(<i>Alisma ranunculoides</i>)	-	x	-	-	-	-	-
Blaartrekkende boter- bloem	(<i>Ranunculus sceleratus</i>)	x	x	-	-	-	-	-
Bleekgele droogbloem	(<i>Gnaphalium luteo-album</i>)	x	x	-	-	-	-	-
Slanke waterkers	(<i>Nasturtium mirophyllum</i>)	x	x	-	-	-	-	-
Gewone kattestaart	(<i>Lythrum salicaria</i>)	x	x	-	-	-	-	-
Blauwe waterreprijs	(<i>Veronica anagallis-aqua- ica</i>)	x	-	-	-	-	-	-
Zeezuring	(<i>Rumex maritimus</i>)	x	-	-	-	-	-	-
Trekrus	(<i>Juncus squarrosus</i>)	x	-	-	-	-	-	-
Tengere rus	(<i>Juncus tenuis</i>)	x	-	-	-	-	-	-
Gewoon sterrekroos	(<i>Callitriche platycarpa</i>)	x	-	-	-	-	-	-

Voor op- en aanmerkingen of voor suggesties houd ik me aanbevolen.

D.Hoek
