

## Reptieleneieren

Ei van reptiel – of toch niet...

**Waarnemingen van reptieleieren worden niet vaak doorgegeven, behalve door broeihoopwerkgroepen. Bij broeihopen gaat het altijd om ringslangeieren die vaak in relatief grote getalen worden gevonden. Een vrouwtje legt jaarlijks tussen de 15 en 30 eieren die veelal als een prop aan elkaar kleven. De ovale eieren zijn 2,5-3,5 cm lang en 1,5-2,5 cm breed. De juveniele slangen snijden met hun eitand de elastische schaal open. Deze sneetjes zijn goed zichtbaar op de uitgekomen verkreukte eieren. Ringslangeieren worden normaliter niet in op het zand los gevonden.**

Jaarlijks komen er waarnemingen langs van ovale omhulsels met zo'n grote diameter, gevonden losliggend op het zand. Daarom worden deze doppen doorgegeven als zandhagedis-ei. Maar de eieren van de zandhagedis zijn maar 1,3-0,9 cm groot (vers). Nadat de juveniele hagedissen eruit zijn gekropen verschrompelt het eitje tot een gerimpeld perkamentachtig plat eitje. Dat lijkt geenszins op de ongekrukte grote doppen met een maat van een ringslangenei.

### Hageveld-eieren

Deze doppen zijn vaak oude cocons van de nachtvlinder hageheld! Een imposante grote nachtvlinder met dito rups. De rups is harig en wordt vaak zonnend gezien in de heide of lopend over de grond. De rupsen leven van allerlei loofbomen en struiken, waaronder sleedoorn, duindoorn, wilg, struikhei, braam en bosbes en kunnen gevonden worden in de periode september-mei. De rupsen verpoppen zich in de vegetatie. Na uitkomen raken de lege omhulsels los en kunnen de dopjes gevonden worden op de grond.

De hageheld is algemeen voorkomend op de zandgronden en in de duinen. Net als de zandhagedis, welke echter een beperktere verspreiding heeft! Niet zo vreemd dat door leken deze cocons voor reptieleieren worden aangezien, gevonden op het zand dus redenerend dat het wel een ei van de zandhagedis zal zijn. Als er niet geredeneerd wordt, maar nauwkeurig wordt geobserveerd, kan je zelf zien dat aan de binnenkant van de cocon haren zitten. En de cocons hebben een gaatje aan een korte kant, en geen sneden van een eitand.



**Cocons van de hageheld worden nogal eens verward met eieren van de zandhagedis. Links uitgekomen cocons van de nachtvlinder, rechts uitgekomen eieren van de zandhagedis.**

**(Foto: Annemarie van Diepenbeek)**

### En zandhagedissen eieren, zijn die wel te vinden dan?

Deze eitjes worden tot een diepte van tien centimeter gelegd. Een geoefend oog kan ze vinden een boven op het zand. Maar zandplekjes afschrapen op zoek naar uitgekomen legsels kan ook vanaf eind oktober tot eind mei. Een tip is dan een zeefje mee te gebruiken!

**Edo Goverse**